Difficultés pour lire ce message? Lisez-le dans votre navigateur

nam aidsmap

Reporter officiel des nouvelles scientifiques en ligne, AIDS 2012

19ème Conférence Internationale sur le SIDA, 22-27 Juillet Washington DC, Etats-Unis

AIDS 2012

Lundi 23 juillet 2012

Table des matières

- Eradiquer le SIDA – La conférence internationale sur le SIDA s'ouvre à Washington
- A la recherche de la guérison
- La guérison – Opinions des personnes séropositives
- Le VIH, la stigmatisation et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes
- *Tenez vos promesses*

Donate

Eradiquer le SIDA – La conférence internationale sur le SIDA s'ouvre à Washington

Dr. Diane Havlir, coprésidente américaine d'AIDS 2012, parle à la séance d'ouverture. © IAS/Ryan Rayburn - Commercialimage.net

Les progrès récents en matière de prévention et de traitement du VIH signifient que le monde peut mettre fin à l'épidémie de sida, ont été avisés les délégués à la cérémonie d'ouverture de la 19ème Conférence Internationale sur le SIDA à Washington.

Toutefois, cet objectif ne sera atteint que si la volonté politique et la solidarité internationale sont présentes.

Les progrès récents en matière de prévention et de traitement du VIH signifient que le monde peut mettre fin à l'épidémie de sida, ont été avisés les délégués à la cérémonie d'ouverture de la 19ème Conférence Internationale sur le SIDA à Washington.

Toutefois, cet objectif ne sera atteint que si la volonté politique et la solidarité internationale sont présentes.

On a rappelé aux délégués présents à la cérémonie d'ouverture d'AIDS 2012 les derniers résultats des recherches sur les méthodes de prévention, qui, si elles étaient largement mises en œuvre, pourraient conduire à d'importantes réductions dans les taux de transmission du VIH et de décès liés au sida.

Parmi ces méthodes:

- L'utilisation du traitement anti-VIH en prévention.
- L'expansion des programmes de circoncisions.
- L'utilisation des trithérapies pendant la grossesse et l'allaitement.
- La prophylaxie pré-exposition (PrEP).
- Le dépistage intensifié de la tuberculose chez les patients séropositifs et chez les patients séropositifs tuberculeux.
- L'initiation plus rapide du traitement anti-VIH.

Il a été souligné que ces méthodes fournissent un soutien supplémentaire aux méthodes bien établies de prévention, telles que la distribution des préservatifs, le dépistage et conseil volontaire, et la réduction des risques pour les utilisateurs de drogues injectables. Cependant, toutes ces initiatives restent encore à être déployées dans de nombreux pays.

Les délégués et les partisans du monde entier ont été encouragés à signer la Déclaration de Washington, une déclaration des mesures qui doivent être prises, fondées sur les dernières preuves scientifiques, pour réduire le nombre de nouvelles infections et accroître la proportion de personnes qui reçoivent un traitement salvateur:

- **L'augmentation des investissements ciblés.**
- **Assurer la prévention du VIH, le traitement et les soins** en accord avec les droits fondamentaux des personnes les plus à risque et dans le plus grand besoin.
- **Eradiquer la stigmatisation, la discrimination, les peines juridiques** contre les personnes séropositives ou à risque de contracter le VIH.