






























Nombre genérico	Nombre comercial	Formulación	Dosis estándar en adultos	Pastillas/día	Principales efectos secundarios	Rest. alimentarias
<b>Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido (ITIN)</b>						
<b>3TC, lamivudina</b>	<i>Epivir</i>	 Comprimidos de 150* y 300mg	150mg dos veces al día o 300mg una vez al día	2 1	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de cabello, fiebre, insomnio, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), cansancio, congestión nasal, dolor articular. <b>Raros:</b> Acidosis láctica, daño hepático.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>Abacavir</b>	<i>Ziagen</i>	 Comprimido de 300mg	300mg dos veces al día o 600mg una vez al día	2	<b>Habituales:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, pérdida de apetito. <b>Raros:</b> Reacción de hipersensibilidad, acidosis láctica.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>AZT, zidovudina</b>	<i>Retrovir</i>	 Cápsulas de 100 y 250mg*	250mg dos veces al día	2	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, mareos, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito, fiebre. <b>Raros:</b> Anomalías sanguíneas, lipoatrofia, acidosis láctica.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>d4T, stavudina</b>	<i>Zerit</i>	 Cápsulas de 20, 30 y 40mg*	<b>P. de más de 60kg:</b> 40mg dos veces al día <b>P. de menos de 60kg:</b> 30mg dos veces al día	2	<b>Habituales:</b> Lipoatrofia, neuropatía periférica, náuseas, diarrea, dolor abdominal, ardor de estómago, mareos, cansancio, exantema ( <i>rash</i> ), picores. <b>Raros:</b> Pancreatitis, acidosis láctica.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>ddI, didanosina (liberación prolongada)</b>	<i>VidexEC</i>	 Cápsulas de 125, 200, 250 y 400mg*	<b>P. de más de 60kg:</b> 400mg una vez al día o 200mg dos veces al día. <b>P. de menos de 60kg:</b> 250mg una vez al día o 125mg dos veces al día.	1 o 2	<b>Habituales:</b> Neuropatía periférica, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), dolor de cabeza. <b>Raros:</b> Pancreatitis, acidosis láctica.	Tomar al menos dos horas después de comer o beber (excepto agua) y esperar otras dos horas antes de volver a comer o beber
<b>FTC, emtricitabina</b>	<i>Emtriva</i>	 Cápsula de 200mg	200mg una vez al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, niveles elevados de quininas, oscurecimiento de la piel en niños. <b>Raros:</b> Acidosis láctica, daño hepático.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleótido (ITINT)</b>						
<b>Tenofovir</b>	<i>Viread</i>	 Comprimido de 300mg	300mg una vez al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, diarrea, mareos, bajos niveles de fosfato en sangre, debilidad, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga, hinchazón, flatulencias. <b>Raros:</b> Problemas renales, disminución de la masa ósea.	Tomar con alimentos
<b>Combinaciones en dosis fija de ITIN/ITINT</b>						
<b>3TC / AZT</b>	<i>Combivir</i>	 Comprimido que incluye 150mg de 3TC y 300mg de AZT	Un comprimido dos veces al día	2	Véase 3TC y AZT.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>3TC / abacavir / AZT</b>	<i>Trizivir</i>	 Comprimido que incluye 150mg de 3TC, 300mg de abacavir y 300mg de AZT	Un comprimido dos veces al día	2	Véase 3TC, abacavir y AZT.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>3TC / abacavir</b>	<i>Kivexa (UE)</i>	 Comprimido que incluye 300mg de 3TC y 600mg de abacavir	Un comprimido una vez al día	1	Véase 3TC y abacavir.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>FTC / tenofovir</b>	<i>Truvada</i>	 Comprimido que incluye 200mg de FTC y 300mg de tenofovir	Un comprimido una vez al día	1	Véase FTC y tenofovir.	Tomar con alimentos
<b>Combinaciones en dosis fija de ITIN/ITINT/ITINN</b>						
<b>FTC / tenofovir / efavirenz</b>	<i>Atripla</i>	 Comprimido que incluye 600mg de efavirenz, 200mg de FTC y 300mg de tenofovir	Un comprimido una vez al día	1	Véase FTC, tenofovir y efavirenz.	Tomar con el estómago vacío, preferiblemente a la hora de irse a la cama
<b>FTC / rilpivirina / tenofovir</b>	<i>Eviplera (UE)</i>	 Comprimido que incluye 200mg de FTC, 25mg de rilpivirina y 300mg de tenofovir	Un comprimido una vez al día	1	Véase FTC, rilpivirina y tenofovir.	Tomar con una comida
<b>Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN)</b>						
<b>Efavirenz</b>	<i>Sustiva Stocrin</i>	 Comprimido de 600mg* y cápsula de 200mg	600mg una vez al día	1 o 3	<b>Habituales:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), mareos, alteraciones del sueño, sueños anómalos, problemas de concentración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, ansiedad, depresión. <b>Raros:</b> Psicosis, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave, problemas hepáticos.	Tomar con el estómago vacío, preferiblemente a la hora de irse a la cama
<b>Etravirina</b>	<i>Intelence</i>	 Comprimidos de 100 y 200mg*	200mg dos veces al día	2 o 4	<b>Habituales:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), neuropatía periférica. <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave (síndrome de Stevens Johnson).	Tomar con alimentos
<b>Nevirapina</b>	<i>Viramune</i>	 Comprimido de 200mg	200mg una vez al día durante dos semanas <b>posteriormente</b> , 200mg dos veces al día	2	<b>Habituales:</b> Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago, diarrea. <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave (síndrome de Stevens Johnson).	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>Nevirapina (liberación prolongada)</b>	<i>Viramune XR</i>	 Comprimido de 400mg	400mg una vez al día tras un periodo de introducción con nevirapina de liberación no prolongada	1	<b>Habituales:</b> Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago, diarrea. <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave (síndrome de Stevens Johnson).	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>Rilpivirina</b>	<i>Edurant</i>	 Comprimido de 25mg	25mg una vez al día	1	<b>Habituales:</b> Insomnio, dolor de cabeza, exantema ( <i>rash</i> ), cambios de humor, depresión. <b>Raros:</b> En dosis superiores a 25mg puede provocar alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar con una comida
<b>Inhibidores de la proteasa</b>						
<b>Atazanavir</b>	<i>Reyataz</i>	 Cápsulas de 150, 200 y 300mg*	300mg con 100mg de ritonavir una vez al día o 400mg con 100mg de ritonavir una vez al día con efavirenz o nevirapina	2 o 3 §	<b>Habituales:</b> Náuseas, diarrea, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), dolor estomacal, dolor de cabeza, insomnio (dificultad para dormir), vómitos, hiperbilirrubinemia, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, fiebre. <b>Raros:</b> Función hepática anómala, alteraciones en el ritmo cardiaco.	Tomar con alimentos
<b>Darunavir</b>	<i>Prezista</i>	 Comprimidos de 400 y 600mg*	600mg con 100mg de ritonavir dos veces al día o 800mg con 100mg de ritonavir una vez al día	3 o 4 §	<b>Habituales:</b> Diarrea, náuseas, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago, diarrea. <b>Raros:</b> Función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar con alimentos
<b>Fosamprenavir</b>	<i>Telzir</i>	 Comprimido de 700mg	700mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	4 §	<b>Habituales:</b> Niveles elevados de lípidos, náuseas, vómitos, diarrea, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, cansancio, hormigueo alrededor de la boca, alteraciones de la función hepática y del páncreas, toxicidad hepática, diabetes. <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave, alteraciones del ritmo cardiaco.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>Indinavir</b>	<i>Crixivan</i>	 Cápsulas de 100, 200 y 400mg*	800mg tres veces al día	6	<b>Habituales:</b> Piedras renales, dolor abdominal, lipodistrofia, náuseas, vómitos, ardor de estómago, diarrea, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), dolor de cabeza, mareos, sequedad de piel y boca, cansancio, insomnio, toxicidad hepática, diabetes, cambios en los recuentos sanguíneos, debilidad. <b>Raros:</b> Anomalías hepáticas, alteraciones en el ritmo cardiaco.	Tomar una hora antes de comer o dos horas después, o acompañado de un aperitivo ligero y bajo en grasas
<b>Lopinavir / ritonavir</b>	<i>Kaletra</i>	 Comprimido que incluye 200mg de lopinavir y 50mg de ritonavir	Dos comprimidos dos veces al día o cuatro comprimidos una vez al día	4	<b>Habituales:</b> Lipodistrofia, niveles elevados de enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, debilidad, ardor de estómago, dolor de cabeza, niveles elevados de lípidos, toxicidad hepática, diabetes. <b>Raros:</b> Alteraciones del ritmo cardiaco.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>Ritonavir</b>	<i>Norvir</i>	 Cápsula de 100mg* y comprimido de 100mg	<b>Dosis completa:</b> 600mg dos veces al día <b>Para 'potenciar' otros IP:</b> 100 - 200mg una o dos veces al día	12 1 a 4	<b>Habituales (con la dosis completa):</b> Niveles elevados de lípidos y enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, debilidad, insensibilidad alrededor de la boca, mal sabor de boca, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes. <b>Habituales (con la dosis baja):</b> Niveles elevados de lípidos. <b>Raros:</b> Alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar con alimentos para evitar las náuseas
<b>Saquinavir</b>	<i>Invirase</i>	 Cápsula de 200mg y comprimido de 500mg*	1000mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	6 §	<b>Habituales:</b> Lipodistrofia, náuseas, vómitos, diarrea, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), cansancio, niveles elevados de enzimas hepáticas y de lípidos, toxicidad hepática, diabetes. <b>Raros:</b> Alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar en las dos horas siguientes a una comida
<b>Tipranavir</b>	<i>Aptivus</i>	 Cápsula de 250mg	500mg con 200mg de ritonavir dos veces al día	8 §	<b>Habituales:</b> Náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, cansancio, dolor de cabeza, fiebre, anomalías hepáticas, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, aumentos de lípidos, flatulencia. <b>Raros:</b> Hemorragia cerebral, alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar con alimentos
<b>Inhibidores de la fusión</b>						
<b>T-20, enfuvirtida</b>	<i>Fuzeon</i>	 Polvo para disolver en agua	Inyección subcutánea de 90mg dos veces al día	-	<b>Habituales:</b> Reacción en el punto de inyección, infecciones del tracto respiratorio, neuropatía periférica, pérdida de peso.	Sin restricciones alimentarias
<b>Inhibidores del CCR5</b>						
<b>Maraviroc</b>	<i>Celsentri</i>	 Comprimidos de 150mg* y de 300mg	300mg dos veces al día o 150mg dos veces al día con todos los IP potenciados con ritonavir excepto tipranavir o 600mg dos veces al día con efavirenz o etravirina	2 a 4	<b>Habituales:</b> Náuseas, diarrea, fatiga, dolor de cabeza.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
<b>Inhibidores de la integrasa</b>						
<b>Raltegravir</b>	<i>Isentress</i>	 Comprimido de 400mg	400mg dos veces al día	2	<b>Habituales:</b> Dolor de cabeza, insomnio. <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave, reacción de hipersensibilidad.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos

\*Formulación mostrada. § Incluyendo la/s cápsula/s de ritonavir.

NAM ha adoptado todas las precauciones razonables en la elaboración de esta publicación. Ni NAM ni los editores se hacen responsables de cualquier imprecisión, error o hecho más allá de su control. La inclusión de información sobre cualquier tratamiento o terapia no supone una aceptación de los mismos por parte de NAM o los editores. La información debería emplearse siempre acompañada de asesoramiento médico profesional. Si desea traducir, adaptar o reproducir esta hoja informativa, por favor, contacta con nuestra entidad.  
Email info@nam.org.uk Web www.aidsmap.com

Contenido y diseño financiado por el Departamento de Salud del Reino Unido. Traducción financiada por Merck, Sharp and Dohme (MSD).



Agradecemos a nuestra organización asociada en España, Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GTI) la traducción este recurso al español.  
Email info@gtt-vih.org Web www.gtt-vih.org