






























Международное название	Торговое название	Выпускаемая форма	Стандартная доза для взрослого	Число таб в день	Главные побочные эффекты	Рекомендации по приему	
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ)							
ЗТС, ламивудин	Эпивир		Таблетки 150* и 300 мг	150 мг дважды в день или 300 мг один раз в день	2 1	Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, головная боль, боль в животе, потеря волос, ознобы, бессонница, кожная сыпь, утомляемость, суставные боли, заложенность носа. Редко-встречающиеся: молочнокислый ацидоз и повреждение печени (лекарственный гепатит)	Можно принимать как во время так и после еды
Абакавир	Зиаген		300 мг таблетки	300 мг дважды в день или 600 мг один раз в день	2	Часто-встречающиеся: сыпь, тошнота, рвота, диарея, ознобы, головная боль, усталость, потеря аппетита Редко-встречающиеся: реакции гиперчувствительности, молочнокислый ацидоз	Можно принимать как во время так и после еды
АЗТ, зидовудин	Ретровир		100 и 250мг* капсулы	250 мг дважды в день	2	Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, утомляемость, мышечная боль, головная боль, головокружение, слабость, потеря аппетита, ознобы Редко-встречающиеся: нарушения кроветворения, липоатрофия, молочнокислый ацидоз	Можно принимать как во время так и после еды
d4T, ставудин	Зерит		20, 30 и 40 мг* капсулы	Пациенты с массой более 60 кг: 40 мг дважды в день Пациенты с массой тела менее 60 кг: 30 мг дважды в день	2	Часто-встречающиеся: липоатрофия, периферическая невропатия, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, изжога, головокружение, усталость, кожная сыпь, чесотка Редко-встречающиеся: панкреатит, молочнокислый ацидоз	Можно принимать как во время так и после еды
ddl, диданозин (продолжительный препарат)	Видекс		125, 200, 250 и 400 мг* капсулы	Пациенты более 60 кг: 400 мг один раз в день или 200 мг дважды в день Пациенты менее 60 кг: 250 мг один раз в день или 125 мг дважды в день	1 или 2	Часто-встречающиеся: периферическая невропатия, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, кожная сыпь, головная боль Редко-встречающиеся: панкреатит, молочнокислый ацидоз	Принимать натощак: по крайней мере два часа до или после приема еды или любых напитков, за исключением воды
FTC, эмтрицитабин	Эмтрива		200 мг капсулы	200 мг один раз в день	1	Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, головная боль, повышение уровня киназа, гиперпигментация у детей Редко-встречающиеся: молочнокислый ацидоз, лекарственный гепатит	Можно принимать как во время так и после еды
Нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы (НТИОТ)							
Тенофовир	Виреад		300 мг таблетки	300 мг один раз в день	1	Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, головокружение, понижение фосфата в крови, слабость, кожная сыпь, головная боль, боли в животе, усталость, повышенное газообразование Редко-встречающиеся: нарушение функции почек, истончение костей (остеопороз)	Принимайте во время еды
НИОТ/НТИОТ комбинированные препараты							
ЗТС/АЗТ	Комбивир		Препарат содержит 150 мг ЗТС и 300 мг АЗТ	Одна таблетка два раза в день	2	Смотрите в разделах побочных эффектов для ЗТС и АЗТ	Можно принимать как во время так и после еды
ЗТС / абакавир/ АЗТ	Тризивир		Препарат содержит 150 мг ЗТС, 300 мг абакавира и 300 мг АЗТ	Одна таблетка два раза в день	2	Смотрите в разделах побочных эффектов для ЗТС, абакавира и АЗТ	Можно принимать как во время так и после еды
ЗТС /абакавир	Кивекса		Препарат содержит 300 мг ЗТС и 600 мг абакавира	Одна таблетка один раз в день	1	Смотрите в разделе побочных эффектов для ЗТС и абакавира	Можно принимать как во время так и после еды
Эмтрицитабин (FTC) / тенофовир	Трувада		Препарат содержит 200 мг эмтрицитабина и 300 мг тенофовира	Одна таблетка один раз в день	1	Смотрите в разделе побочных эффектов для эмтрицитабина (FTC) и тенофовира	Принимать во время или сразу после еды
НИОТ / НТИОТ / ННИОТ комбинированные препараты							
Эмтрицитабин (FTC) / тенофовир / эфавиренц	Атрилла		Препарат состоит из 600 мг эфавиренца, 200 мг эмтрицитабина и 300 мг тенофовира	Одна таблетка один раз в день	1	Смотрите в разделе побочных эффектов для эмтрицитабина (FTC), тенофовира и эфавиренца	Принимать на пустой желудок и желательнее непосредственно перед сном
Эмтрицитабин (FTC) / рилпивирин / тенофовир	Эвиплера		Препарат содержит 200 мг FTC, 25 мг рилпивирин и 300мг тенофовир	Одна таблетка один раз в день	1	Смотрите в разделах побочных эффектов для эмтрицитабина (FTC), рилпивирин и тенофовира	Принимать во время еды
Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ)							
Эфавиренц	Сустива Стокрин		600 мг таблетки* и 200 мг капсулы	600 мг однократно в день	1 или 3	Часто-встречающиеся: кожная сыпь, головокружение, нарушение сна, кошмары, нарушение внимания и концентрации, тошнота и рвота, головная боль, усталость, диарея, тревожное состояние и депрессия Редко-встречающиеся: психоз, тяжело-протекающая кожная реакция, нарушение функции печени	Принимать на пустой желудок и желательнее перед сном
Этравирин	Интеленс		100 и 200 мг* таблетки	200 мг дважды в день	2 или 4	Часто-встречающиеся: кожная сыпь, периферическая невропатия Редко-встречающиеся: тяжело-выраженная реакция кожи и слизистых синдром Стивенса-Джонсона	Принимать с едой
Невирапин	Вирумун		Таблетки 200 мг	200 мг один раз в день в течении двух недель затем 200мг дважды в день	2	Часто-встречающиеся: повреждение печени, реакции гиперчувствительности, сыпь, тошнота, головная боль, утомляемость, боль в животе, диарея Редко-встречающиеся: тяжело-выраженная реакция кожи и слизистых(синдром Стивенса-Джонсона)	Можно принимать как во время так и после еды
Невирапин (продолжительный)	Вирумун XR		Таблетки 400мг	400мг один раз в день после завершения приема насыщающей дозы непродолжительного препарата	1	Часто-встречающиеся: лекарственный гепатит, реакции гиперчувствительности, сыпь, тошнота, головная боль, утомляемость, парестезия вокруг рта, диарея Редко-встречающиеся: тяжело-выраженная реакция кожи и слизистых (синдром Стивенса-Джонсона)	Можно принимать как во время так и после еды
Рилпивирин	Эдурант		Таблетки 25мг	25мг один раз в день	1	Часто-встречающиеся: бессонница, головная боль, сыпь, перепады в настроении, депрессия Редко-встречающиеся: при дозировке превышающей 25мг - нарушение сердечного ритма	Принимать во время или сразу после еды
Ингибиторы протеазы							
Атазанавир	Реватаз		150, 200 и 300мг* капсулы	300мг со 100мг ритонавира один раз в день или 400мг со 100мг ритонавира однократно в день в сочетании с эфавиренцем или невирапином	2 или 3 §	Часто-встречающиеся: изжога, тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, боль в животе, головная боль, бессонница, повышения билирубина крови, желтуха, липодистрофия, лекарственный гепатит, диабет Редко-встречающиеся: образование камней в почках, нарушение функции печени, нарушение ритма сердца	Принимать во время или сразу после еды
Дарунавир	Презиста		Таблетки 400 и 600мг*	600мг со 100мг ритонавира дважды в день или 800мг со 100мг ритонавира один раз в день	3 или 4 §	Часто-встречающиеся: диарея, тошнота, рвота, кожная сыпь, боль в животе, головная боль, липодистрофия, лекарственный гепатит, ознобы и диабет Редко-встречающиеся: нарушение функции печени, нарушение ритма сердца	Во время или сразу после еды
Фосампренавир	Телзир		Таблетки 700мг	700мг со 100мг ритонавира дважды в день	4 §	Часто-встречающиеся: повышение липидов крови, тошнота, рвота, кожная сыпь, диарея, боль в животе, головная боль, утомляемость, парестезия вокруг рта, нарушение функции печени и поджелудочной железы, токсический гепатит, липодистрофия, диабет Редко-встречающиеся: тяжело-протекающая кожная реакция, нарушение ритма сердца	Можно принимать как во время так и после еды
Индинавир	Криксиван		100, 200, и 400мг* капсулы	800мг три раза в день	6	Часто-встречающиеся: почечные камни, боль в животе, липодистрофия, тошнота, рвота, изжога, диарея, сыпь, сухость кожных покровов и рта, головная боль, головокружение, слабость и усталость, бессонница, токсический гепатит, диабет, нарушение крови Редко-встречающиеся: нарушение функции печени, нарушения ритма сердца	Принимать за один час до еды или через два часа после еды или вместе с небольшим количеством нежирной пищи
Лопинавир / ритонавир	Калетра		Препарат содержащий 200мг лопинавира и 50мг ритонавира	Две таблетки два раза в день или четыре таблетки один раз в день	4	Часто-встречающиеся: липодистрофия, повышение печеночных ферментов, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, слабость, изжога, головная боль, повышение липидов крови, токсический гепатит, диабет Редко-встречающиеся: нарушения ритма сердца	Как во время так и после еды
Ритонавир	Норвир		100мг капсулы* и 100мг таблетки	Полная дозировка: 600мг дважды в день Для усиления других ингибиторов протеазы 100 – 200мг один или два раза в день	12 От 1 до 4	Часто-встречающиеся (при применении полной дозировки): повышение липидов и печеночных ферментов, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, головная боль, слабость, онемение вокруг рта, изменение вкуса, липодистрофия, токсический гепатит, диабет Часто-встречающиеся (при низкой дозировке): повышение липидов крови Редко-встречающиеся: нарушения ритма сердца	Во время еды для избежания тошноты
Саквинавир	Инвироза		200мг капсулы и 500мг таблетки*	1000мг со 100мг ритонавира дважды в день	6 §	Часто-встречающиеся: липодистрофия, тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, усталость, повышение уровня печеночных ферментов и липидов, токсический гепатит, диабет Редко-встречающиеся: нарушения ритма сердца	Принимайте в течении двух часов от приема пищи
Типранавир	Аптивус		250мг капсулы	500мг с 200мг ритонавира дважды в день	8 §	Часто-встречающиеся: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, усталость, головная боль, ознобы, нарушение функции печени и токсический гепатит, кожная сыпь, липодистрофия, повышение уровня липидов крови, диабет, повышенное газообразование Редко-встречающиеся: кровоизлияние в головной мозг, нарушение ритма сердца	Принимайте вместе с едой
Ингибиторы слияния							
T-20, энфовиритид	Фузвон		Порошок растворимый в воде	Иньекция 90мг подкожно дважды в день	-	Часто-встречающиеся: кожная реакция в месте инъекции, респираторные инфекции, периферическая невропатия, потеря массы тела	Независимо от приема пищи
Ингибитор CCR5							
Маравирик	Селзенстри		150*, 300мг таблетки	300мг дважды в день или 150мг дважды в день с любыми усиленными ритонавиром ингибиторами протеазы за исключением типранавира или 600мг дважды в день с эфавиренцем или этравирин.	От 2 до 4	Часто-встречающиеся: тошнота, диарея, усталость и головная боль	Можно принимать как во время так и после еды
Ингибитор интегразы							
Ралтегравир	Изентрес		400мг таблетки	400мг дважды в день	2	Часто-встречающиеся: головная боль, бессонница Редко-встречающиеся: реакции гиперчувствительности, тяжелая кожная реакция	Можно принимать как во время так и после еды

*Число таблеток в отношении данной дозировки § с учетом капсул ритонавира.

NAM принял все зависящие от организации предосторожности при публикации данного информационного листа. NAM не является ответственным в случае наличия любых неточностей или фактических ошибок. NAM не является ответственным за подтверждение информации в отношении какого-либо вида лечения. Опубликованная здесь информация должна использоваться только совместно с консультацией медицинского специалиста. Если вы желаете перевести, адаптировать или распространять данный информационный листок, пожалуйста, напишите нам.

Наши контактные данные: Email info@nam.org.uk Вебсайт www.aidsmap.com

Издание (содержание и дизайн) подготовлено при финансовой поддержке Департамента здравоохранения Великобритании. Благодарим Merck, Sharp and Dohme за оказание финансовой поддержки данного проекта.