





























Nombre genérico	Nombre comercial	Formulación	Dosis estándar en adultos	Compridos/día	Principales efectos secundarios	Restricciones alimentarias	
Regímenes en un único comprimido							
Dolutegravir / abacavir / lamivudina	Triumeq		Comprimido que contiene 50mg de dolutegravir, 600mg de abacavir y 300mg de lamivudina.	Un comprimido, una vez al día.	1	Véanse dolutegravir, abacavir y lamivudina.	Se puede tomar con o sin alimentos
Efavirenz / emtricitabina / tenofovir	Atripla		Comprimido que contiene 600mg de efavirenz, 200mg de emtricitabina y 245mg de tenofovir	Un comprimido al día	1	Véanse efavirenz, emtricitabina y tenofovir	Tomar con el estómago vacío, preferentemente al acostarse
Elvitegravir / cobicistat / emtricitabina / tenofovir	Stribild		Comprimido que contiene 150mg de elvitegravir, 150mg de cobicistat, 200mg de emtricitabina y 245mg de tenofovir	Un comprimido al día	1	Habituales: Náuseas, diarrea, sueños extraños, dolor de cabeza, fatiga, mareos, cansancio, exantema cutáneo (rash), flatulencias y somnolencia. Raros: Problemas hepáticos graves, problemas renales, disminución de la masa ósea	Tomar con alimentos
Rilpivirina / emtricitabina / tenofovir	Eviplera		Comprimido que contiene 25mg de rilpivirina, 200mg de emtricitabina y 245mg de tenofovir	Un comprimido al día	1	Véanse rilpivirina, emtricitabina y tenofovir	Tomar con alimentos
Combinaciones a dosis fijas							
Abacavir / lamivudina	Kivexa		Comprimido que contiene 600mg de abacavir y 300mg de lamivudina	Un comprimido al día	1	Véanse abacavir y lamivudina	Se puede tomar con o sin alimentos
Abacavir / lamivudina / zidovudina	Trizivir		Comprimido que contiene 300mg de abacavir, 150mg de lamivudina, y 300mg zidovudina	Un comprimido dos veces al día	2	Véanse abacavir, lamivudina y zidovudina	Se puede tomar con o sin alimentos
Emtricitabina / tenofovir	Truvada		Comprimido que contiene 200mg de emtricitabina y 245mg de tenofovir	Un comprimido al día	1	Véanse emtricitabina y tenofovir	Es preferible tomarlo con alimentos, pero puede tomarse con el estómago vacío
Lamivudina / zidovudina	Combivir		Comprimido que contiene 150mg de lamivudina y 300mg zidovudina	Un comprimido dos veces al día	2	Véanse lamivudina y zidovudina	Se puede tomar con o sin alimentos
Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido (ITIN)							
Abacavir	Ziagen		Comprimido de 300mg	300mg dos veces al día o 600mg una vez al día	2	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, cansancio, pérdida de apetito Raros: Reacción de hipersensibilidad, acidosis láctica	Se puede tomar con o sin alimentos
Emtricitabina	Emtriva		Cápsula de 200mg	200mg una vez al día	1	Habituales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, aumento de los niveles de la creatina quinasa, oscurecimiento de la piel Raros: Acidosis láctica, daño hepático	Se puede tomar con o sin alimentos
Lamivudina	Epivir		Comprimidos de 150* y 300mg	150mg dos veces al día o 300mg una vez al día.	2 1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de cabello, fiebre, insomnio (dificultad para conciliar el sueño), exantema cutáneo (rash), cansancio, dolor articular Raros: Acidosis láctica, daño hepático	Se puede tomar con o sin alimentos
Zidovudina	Retrovir		Cápsulas de 100 y 250mg*	250mg dos veces al día.	2	Habituales: Náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, mareos, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito, fiebre Raros: Alteraciones sanguíneas, lipotrofia, acidosis láctica	Se puede tomar con o sin alimentos
Inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de nucleótido (ITINT)							
Tenofovir	Viread		Comprimido de 245mg	245mg una vez al día	1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, mareos, niveles bajos de fosfato en sangre, debilidad, exantema cutáneo (rash), dolor de cabeza, dolores estomacales, fatiga, abotargamiento. Raros: Problemas renales, adelgazamiento óseo	Tomar con alimentos
Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN)							
Efavirenz	Sustiva Stocrin		Comprimido* de 600mg y cápsula de 200mg.	600mg una vez al día	1 o 3	Habituales: Exantema cutáneo (rash), alteraciones del sueño, sueños anómalos, problemas de concentración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas Raros: Psicosis, Exantema (rash) grave, problemas hepáticos	Tomar con el estómago vacío, preferiblemente al acostarse
Etravirina	Intencele		Comprimido de 100mg y 200mg*	200mg dos veces al día	2 o 4	Habituales: Exantema cutáneo (rash), neuropatía periférica Raros: Exantema (rash) grave (síndrome de Stevens Johnson)	Tomar con alimentos
Nevirapina	Viramune		Comprimido de 200mg	200mg una vez al día durante dos semanas y posteriormente 200mg dos veces al día	2	Habituales: Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo (rash), náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor estomacal, diarrea Raros: Exantema (rash) grave (síndrome de Stevens Johnson)	Se puede tomar con o sin alimentos
Nevirapina	Viramune de liberación prolongada		Comprimido de 400mg	400mg una vez al día tras el periodo de introducción con nevirapina de liberación no prolongada	1	Habituales: Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo (rash), náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor estomacal, diarrea Raros: Exantema (rash) grave (síndrome de Stevens Johnson)	Tragar entero. Se puede tomar con o sin alimentos
Rilpivirina	Eduvant		Comprimido de 25mg	25mg una vez al día	1	Habituales: Insomnio (problemas para dormir), dolor de cabeza, exantema cutáneo (rash), aumento de las enzimas hepáticas, depresión, mareos, dolores estomacales, vómitos Raros: En dosis superiores a 25mg puede provocar alteraciones del ritmo cardiaco	Tomar junto con una comida principal
Inhibidores de la proteasa (IP)							
Atazanavir	Reyataz		Cápsulas de 150, 200 y 300mg*	300mg con 100mg de ritonavir una vez al día	2 o 3	Habituales: Náuseas, diarrea, exantema cutáneo (rash), dolor estomacal, dolor de cabeza, insomnio (problemas para conciliar el sueño), vómitos, hiperbilirrubinemia, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes Raros: Piedras renales, función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco	Tomar con alimentos
Darunavir	Prezista		Comprimidos de 600mg* y 800mg	800mg con 100mg de ritonavir una vez al día o 600mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	2 a 4	Habituales: Diarrea, náuseas, exantema cutáneo (rash), dolor estomacal, vómitos, dolor de cabeza, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, fiebre Raros: Función hepática anómala, cambios en el ritmo cardiaco	Tomar con alimentos
Fosamprenavir	Telzir		Comprimido de 700mg	700mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	4	Habituales: Aumento del nivel de lípidos, náuseas, vómitos, diarrea, exantema cutáneo (rash), dolor abdominal, dolor de cabeza, mareo, cansancio, hormigueo alrededor de la boca, cambios en la función hepática y del páncreas, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes. Raros: Exantema (rash) grave, alteraciones del ritmo cardiaco	Se puede tomar con o sin alimentos
Lopinavir / ritonavir	Kaletra		Comprimido que contiene 200mg de lopinavir y 50mg de ritonavir	Dos comprimidos dos veces al día o cuatro comprimidos una vez al día.	4	Habituales: Lipodistrofia, aumento de las enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, debilidad, acidez gástrica, dolor de cabeza, aumento de los niveles de lípidos, toxicidad hepática, diabetes Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco	Tragar entero. Se puede tomar con o sin alimentos
Ritonavir	Norvir		Comprimido de 100mg	Dosis completa: 600mg dos veces al día. Para 'potenciar' a otros IP: 100-200mg una o dos veces al día	12 1 a 4	Habituales (a dosis completa): Aumento de los niveles de lípidos y enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, debilidad, insensibilidad alrededor de la boca, mal sabor de boca, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes Habituales (a dosis reducida): Aumento de los niveles de lípidos Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco	Tragar entero. Acompañarlo de alimentos para evitar las náuseas
Tipranavir	Aptivus		Cápsula de 250mg	500mg con 200mg de ritonavir dos veces al día	8	Habituales: Náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, cansancio, dolor de cabeza, fiebre, anomalías hepáticas, exantema cutáneo (rash), lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, aumento del nivel de lípidos, flatulencias. Raros: Hemorragias en el cerebro, alteraciones del ritmo cardiaco	Tomar con alimentos
Inhibidor del CCR5							
Maraviroc	Celsenti		Comprimidos de 150* y 300mg	300mg dos veces al día o 150mg dos veces al día con un IP potenciado con ritonavir excepto tipranavir y fosamprenavir o 600mg dos veces al día con efavirenz o etravirina sin un IP potenciado con ritonavir	2 a 4	Habituales: Náuseas, diarrea, fatiga, dolor de cabeza Raros: Reacción alérgica, problemas hepáticos	Se puede tomar con o sin alimentos
Inhibidores de la integrasa							
Dolutegravir	Tivicay		Comprimido de 50mg	50mg una vez al día o 50mg dos veces al día si se toma con efavirenz, nevirapina o tipranavir o en el caso de que se sepa que el VIH es resistente a los inhibidores de la integrasa	1 o 2	Habituales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, exantema cutáneo (rash), picazón, vómitos, dolor o malestar estomacal, insomnio (problemas para conciliar el sueño), mareos, sueños anómalos, fatiga, flatulencia, aumento de los niveles de enzimas hepáticas y musculares Raros: Reacción alérgica, problemas hepáticos	Se puede tomar con o sin alimentos
Elvitegravir	Vitekta		Comprimido de 85, 150mg*	85mg una vez al día con atazanavir/ritonavir o lopinavir/ritonavir o 150mg una vez al día con darunavir/ritonavir o fosamprenavir/ritonavir	1	Habituales: Dolor estomacal, vómitos, exantemas cutáneos (rash), dolor de cabeza, diarrea, náuseas, cansancio Raros: Depresión, pensamientos suicidas, insomnio, problemas digestivos (dispepsia), sensación de hinchazón, flatulencia, mareos, hormigueos, somnolencia, alteración del gusto	Tomar con alimentos
Raltegravir	Isentress		Comprimido de 400mg	400mg dos veces al día	2	Habituales: Dolor de cabeza, insomnio (problemas para dormir) Raros: Exantema (rash) grave, reacción de hipersensibilidad, sensación extrema de sed	Se puede tomar con o sin alimentos

*Formulación(es) mostrada(s) § Incluyendo la/s cápsula/s de ritonavir.

Algunos fármacos tienen versiones genéricas, por lo que su aspecto puede variar.
El equipo de edición ha adoptado todas las precauciones razonables en la elaboración de esta publicación. Ni NAM ni el equipo de edición se hacen responsables de cualquier imprecisión o error. La inclusión de información sobre cualquier tratamiento o terapia no significa su apoyo por parte de NAM ni de los editores. La información debería utilizarse siempre acompañada por un asesoramiento médico profesional.
La tabla de fármacos ha sido elaborada por la organización NAM. Esta organización proporciona información actualizada e imparcial a las personas implicadas en la lucha mundial contra el VIH/

sida. En nuestro sitio web puedes encontrar las últimas noticias o registrarte para recibir las actualizaciones en tu correo electrónico. Cualquier opinión sobre nuestros recursos informativos será bienvenida.

NAM, Acorn House, 314-320 Gray's Inn Road, London, WC1X 8DP
Email info@nam.org.uk Web www.aidsmap.com

Agradecemos a ViiV Healthcare su apoyo económico para desarrollar este recurso. ViiV Healthcare no ha tenido ningún tipo de control editorial sobre su contenido.

