




























Numele generic	Numele comercial	Compoziția	Doza standard pentru adulți	Pastile / zi	Principalele efecte secundare	Restricții alimentare
Scheme de tratament cu o singură tabletă						
Efavirenz/emtricitabine/tenofovir	Atripla	 Tableta conține 600mg efavirenz, 200mg emtricitabine și 245mg tenofovir	O tabletă odată pe zi	1	Vezi efavirenz, emtricitabine și tenofovir	Se ia pe stomacul gol, preferabil înainte de culcare
Elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir	Stribild	 Tableta conține 150mg elvitegravir, 150mg cobicistat, 200mg emtricitabine și 245mg tenofovir	O tabletă odată pe zi	1	Comune: Greată, diaree, vise anormale, dureri de cap, oboseală, amețeli, insomnie, erupții cutanate, flatulență, somnolență Rare: Probleme hepatice grave, probleme renale, subțierea oaselor	Se ia în timpul mesei
Rilpivirine/emtricitabine/tenofovir	Eviplera	 Tableta conține 25mg rilpivirine, 200mg emtricitabine și 245mg tenofovir	O tabletă odată pe zi	1	Vezi rilpivirine, emtricitabine și tenofovir	Se ia în timpul mesei
Medicamente combinate în doză fixă						
Abacavir/lamivudine	Kivexa	 Tableta conține 600mg abacavir și 300mg lamivudine	O tabletă odată pe zi	1	Vezi abacavir și lamivudine	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Abacavir/lamivudine/zidovudine	Trizivir	 Tableta conține 300mg abacavir, 150mg lamivudine și 300mg zidovudine	O tabletă de două ori pe zi	2	Vezi abacavir, lamivudine și zidovudine	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Emtricitabine/tenofovir	Truvada	 Tableta conține 200mg emtricitabine și 245mg tenofovir	O tabletă odată pe zi	1	Vezi emtricitabine și tenofovir	Cel mai bine să se ia în timpul mesei, dar se poate lua și pe stomacul gol
Lamivudine / zidovudine	Combivir	 Tableta conține 150mg lamivudine și 300mg zidovudine	O tabletă de două ori pe zi	2	Vezi lamivudine și zidovudine	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Inhibitori nucleozidici de revers transcriptază (INRT)						
Abacavir	Ziagen	 Tableta de 300mg	300mg de două ori pe zi sau 600mg odată pe zi	2	Comune: Greată, vărsături, diaree, febră, dureri de cap, dureri abdominale, oboseală, pierderea poftei de mâncare Rare: reacție de hipersensibilitate, acidoză lactică	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Emtricitabine	Emtriva	 Capsulă de 200mg	200mg odată pe zi	1	Comune: Greată, diaree, dureri de cap, creșterea nivelului creatinei kinaze, întunecarea pielii Rare: acidoză lactică, leziuni hepatice	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Lamivudine	Epivir	 Tablete de 150* și 300mg	150mg de două ori pe zi sau 300mg odată pe zi	2 1	Comune: Greată, vărsături, diaree, dureri de cap, dureri abdominale, pierderea părului, febră, insomnie (tulburări de somn), erupții cutanate, oboseală, dureri articulare Rare: acidoză lactică, leziuni hepatice	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Zidovudine	Retrovir	 Capsule de 100 și 250mg*	250mg de două ori pe zi	2	Comune: Greată, vărsături, oboseală, dureri de cap, amețeli, slăbiciune, dureri musculare, lipsa poftei de mâncare, febră Rare: Tulburări hematologice, lipoatrofie, acidoză lactică	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Inhibitori nucleotidici de revers transcriptază (INRT)						
Tenofovir	Viread	 Tableta de 245mg	245mg odată pe zi	1	Comune: Greată, vărsături, diaree, flatulență, amețeli, niveluri scăzute de fosfat în sânge, stări de slăbiciune, erupții cutanate, dureri de cap, dureri de stomac, oboseală, balonare Rare: Probleme renale, subțierea oaselor	Se ia în timpul mesei
Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptază (INNRT)						
Efavirenz	Sustiva Stocrin	 Tableta * de 600mg și capsulă de 200mg	600mg odată pe zi	1 sau 3	Comune: Erupții cutanate, amețeli, tulburări de somn, vise anormale, tulburări de concentrare, greată, varsături, dureri de cap, oboseală, diaree, anxietate, depresie, gânduri de sinucidere Rare: Psihoză, erupții cutanate severe, probleme cu ficatul	Se ia pe stomacul gol, preferabil la culcare
Etravirine	Intelence	 Tableta de 100 și 200mg*	200mg de două ori pe zi	2 sau 4	Comune: Erupții cutanate, neuropatie periferică Rare: Reacție alergică severă (Sindromul Stevens-Johnson)	Se ia în timpul mesei
Nevirapine	Viramune	 Tableta de 200mg	200mg odată pe zi pentru două săptămâni apoi 200mg de două ori pe zi	2	Comune: Toxicitate hepatică, reacții alergice, erupții cutanate, greată dureri de cap, oboseală, dureri de stomac, diaree Rare: Reacție alergică severă (Sindromul Stevens-Johnson)	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Nevirapine	Viramune cu eliberare prelungită	 Tableta de 400mg	400mg odată pe zi după o perioadă introductivă a nevirapine fără eliberare prelungită	1	Comune: Toxicitate hepatică, reacție alergică, erupții cutanate, greată, dureri de cap, dureri de stomac, diaree Rare: Reacție alergică severă (Sindromul Stevens-Johnson)	Se înghite tot. Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Rilpivirine	Edurant	 Tableta de 25mg	25mg odată pe zi	1	Comune: Insomnie (tulburări de somn), dureri de cap, erupții cutanate, enzime crescute ale ficatului, depresie, amețeli, dureri de stomac, vărsături Rare: La doze mai mari de 25 mg poate provoca o tulburare a ritmului cardiac	Se ia în timpul mesei
Inhibitori de protează (IP)						
Atazanavir	Reyataz	 Capsule de 150, 200 și 300mg*	300mg cu 100mg ritonavir odată pe zi	2 sau 3	Comune: Greată, diaree, erupții cutanate, dureri de stomac, dureri de cap, insomnie (tulburări de somn), vărsături, icter, lipodistrofie, toxicitate hepatică, diabet Rare: Pietre la rinichi, o funcționare anormală a ficatului, schimbări ale ritmului inimii	Se ia în timpul mesei
Darunavir	Prezista	 Tablete de 600mg* și 800mg	800mg cu 100mg ritonavir odată pe zi sau 600mg cu 100mg ritonavir de două ori pe zi	2 la 4	Comune: Diaree, greată, erupții cutanate, dureri stomacale, vărsături, dureri de cap, lipodistrofie, toxicitate hepatică, diabet, febră Rare: Funcționare anormală a ficatului, schimbări ale ritmului inimii	Se ia în timpul mesei
Fosamprenavir	Telzir	 Tableta de 700mg	700mg cu 100mg ritonavir de două ori pe zi	4	Comune: Creșterea lipidelor, greată, vărsături, diaree, erupții cutanate, dureri abdominale, dureri de cap, amețeli, oboseală, furnicături în jurul gurii, schimbări în funcționarea ficatului și a pancreasului, lipodistrofie, toxicitate hepatică, diabet Rare: Erupții cutanate severe, schimbări ale ritmului inimii	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Lopinavir / ritonavir	Kaletra	 Tableta conține 200mg lopinavir și 50mg ritonavir	Două tablete de două ori pe zi sau patru tablete odată pe zi	4	Comune: Lipodistrofie, creșterea enzimelor ficatului, greată, vărsături, diaree, dureri abdominale, slăbiciune, arsuri la stomac, dureri de cap, lipide crescute, toxicitate hepatică, diabet Rare: Schimbări ale ritmului inimii	Se înghite tot. Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Ritonavir	Norvir	 Tableta de 100mg	Doză întreagă: 600mg de două ori pe zi Pentru stimularea altor IP: 100-200mg odată sau de două ori pe zi	12 1 la 4	Comune: (la doză întreagă): Creșterea enzimelor și lipidelor ficatului, greată, vărsături, diaree, dureri abdominale, dureri de cap, slăbiciune, amorțeală în jurul gurii, gust rău, lipodistrofie, toxicitate hepatică, diabet Comune: (la doză redusă): Nivelurile de lipide ridicate Rare: Schimbări ale ritmului inimii	Se înghite tot. Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol, pentru a evita greața
Tipranavir	Aptivus	 Capsulă de 250mg	500mg cu 200mg ritonavir de două ori pe zi	8	Comune: Greată, diaree, vărsături, dureri abdominale, oboseală, dureri de cap, febră, anomalii hepatice și toxicitate hepatică, erupții cutanate, lipodistrofie, diabet, creșterea lipidelor, flatulență Rare: Sângerări la creier, schimbări ale ritmului inimii	Se ia în timpul mesei
Inhibitor de CCR5						
Maraviroc	Celsentri	 Capsule de 150* și 300mg	300mg de două ori pe zi sau 150mg de două ori pe zi cu _ritonavir stimulat cu un inhibitor de protează, exceptând tipranavir și fosamprenavir sau 600mg de două ori pe zi cu efavirenz sau etravirine fără ritonavir stimulat cu un inhibitor de protează	2 la 4	Comune: Greată, diaree, oboseală, dureri de cap Rare: Reacție alergică, probleme ale ficatului	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Inhibitori de integrază						
Dolutegravir	Tivicay	 Tableta de 50mg	50mg odată pe zi sau 50mg de două ori pe zi dacă este luat cu _efavirenz, nevirapine sau tipranavir, sau pentru pacienții cunoscuți ca fiind rezistenți la inhibitorii de protează	1 sau 2	Comune: greată, diaree, dureri de cap, erupții cutanate, mâncărimi, vărsături, dureri de stomac sau disconfort, insomnie (tulburări de somn), amețeli, vise anormale, oboseală, flatulență, creșterea enzimelor hepatice și musculare Rare: Reacție alergică, probleme ale ficatului	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol
Elvitegravir	Vitekta	 Tableta de 85, 150mg*	85mg odată pe zi cu atazanavir/ritonavir sau lopinavir/ritonavir sau 150mg odată pe zi cu darunavir/ritonavir sau fosamprenavir/ritonavir	1	Comune: Dureri stomacale, vărsături, erupții cutanate, dureri de cap, diaree, greată, oboseală Rare: Depresie, gânduri suicidale, insomnie, probleme de digestive (dispezie), senzație de balonare, flatulență, amețeli, furnicături, somnolență, gust anormal	Se ia în timpul mesei
Raltegravir	Isentress	 Tableta de 400mg	400mg de două ori pe zi	2	Comune: Dureri de cap, insomnie, (somn cu dificultăți) Rare: Erupții cutanate severe, hipertensiune, sete foarte accentuată	Se ia în timpul mesei sau pe stomacul gol

*Formulara / formulările arătate. § Include tabletă / tablete de ritonavir.

Sunt disponibile versiuni generice ale unora dintre medicamente, deci aspectul acestora poate varia.
Editorii și-au luat toate precauțiile rezonabile pentru producerea acestei publicații. Nici NAM, nici editorii, nu pot fi trași la răspundere pentru orice neconcordanță, informații sau fapte care lipsesc. Incluziunea informațiilor cu privire la orice tratament sau terapie nu reprezintă o aprobare a acestor tratamente sau terapii din partea NAM sau a editorilor. Informațiile trebuie să fie întotdeauna utilizate în asociere cu sfaturile medicale profesioniste.
Lista de medicamente este produsă de Organizația NAM. NAM pune la dispoziție persoanelor care lucrează în lupta globală anti HIV & SIDA informații actualizate și imparțiale. Te rog să

ne vizitezi pe site-ul nostru, unde poți citi cele mai noi informații despre HIV și te poți înscrie pentru a primi buletinul nostru informativ prin email. Așteptăm părerea ta despre resursele noastre informative.

NAM, Acorn House, 314-320 Gray's Inn Road, London, WC1X 8DP
Email info@nam.org.uk Web www.aidsmap.com

Suntem recunoscători Viiv Healthcare pentru finanțarea acestei resurse. Viiv Healthcare nu a avut control editorial asupra conținutului.