






















Nombre genérico Regímenes en un único comprimido	Nombre comercial	Formulación	Dosis estándar en adultos	Comprimidos/día	Principales efectos secundarios	Restricciones alimentarias
<b>Efavirenz / emtricitabina / tenofovir disoproxil</b>	<i>Atripla</i>	 Comprimido que contiene 600mg de efavirenz, 200mg de emtricitabina y 245mg de tenofovir TDF	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Alteraciones del sueño, cansancio, sueños anómalos, problemas de concentración, mareos, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, aumento de los niveles de creatina quinasa, oscurecimiento de la piel, niveles bajos de fosfato en sangre, debilidad, dolor estomacal, abotargamiento, flatulencia <b>Raros:</b> Reacción alérgica, dolor abdominal, psicosis, inflamación del hígado	Tomar con el estómago vacío, preferentemente al acostarse
<b>Rilpivirina / emtricitabina / tenofovir disoproxil</b>	<i>Eviplera</i>	 Comprimido que contiene 25mg de rilpivirina, 200mg de emtricitabina y 245mg de tenofovir TDF	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, diarrea, mareos, insomnio, dolor de cabeza, debilidad, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), dolor estomacal, fatiga, abotargamiento, flatulencia, alteraciones de la función renal, aumento de niveles de creatina quinasa, oscurecimiento de la piel, cambios de humor, depresión <b>Raros:</b> Alteraciones del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT)	Tomar con alimentos
<b>Rilpivirina / tenofovir alafenamida / emtricitabina</b>	<i>Odefsey</i>	 Comprimido que contiene 25mg de rilpivirina, 25mg de tenofovir TAF, 200mg de emtricitabina	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Reducción de los recuentos de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, aumento de los niveles de lípidos, cansancio, insomnio, depresión, dolor de cabeza, mareos, náuseas, dolor abdominal, vómitos, flatulencia, sequedad de boca, aumento de los niveles de amilasa, enzimas hepáticas y de bilirrubina, exantema ( <i>rash</i> ) <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave y fiebre, anemia	Tomar con alimentos
<b>Elvitegravir / cobicistat / emtricitabina / tenofovir alafenamida</b>	<i>Genvoya</i>	 Comprimido que contiene 150mg de elvitegravir, 150mg de cobicistat, 200mg de emtricitabina, 10mg de tenofovir TAF	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareos, diarrea, vómitos, dolor estomacal, gases, exantema ( <i>rash</i> ), cansancio <b>Raros:</b> Anemia, depresión, hinchazón de piel, cara, labios, lengua o garganta	Tomar con alimentos
<b>Elvitegravir / cobicistat / emtricitabina / tenofovir disoproxil</b>	<i>Stribild</i>	 Comprimido que contiene 150mg de elvitegravir, 150mg de cobicistat, 200mg de emtricitabina, 245mg de tenofovir TDF	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, diarrea, sueños anómalos, dolor de cabeza, fatiga, mareos, insomnio, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), flatulencia, somnolencia <b>Raros:</b> Problemas hepáticos graves, problemas renales, adelgazamiento óseo	Tomar con alimentos
<b>Dolutegravir / abacavir / lamivudina</b>	<i>Triumeq</i>	 Comprimido que contiene 50mg de dolutegravir, 600mg de abacavir y 300mg de lamivudina	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Insomnio (dificultad para dormir), dolor de cabeza, diarrea, náuseas, fatiga, <i>rash</i> , picor, vómitos, dolor estomacal, somnolencia, mareos, pérdida de cabello, depresión, flatulencia, dolor y molestias musculares, dolor articular, nariz irritada o con mocos, indigestión, pérdida del apetito <b>Raros:</b> Inflamación del hígado o del páncreas, pensamientos y conductas suicidas, <i>rash</i> grave	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido/nucleótido (ITIN/ITINt)</b>						
<b>Abacavir</b>	<i>Ziagen</i>	 Comprimido de 300mg	300mg dos veces al día o 600mg una vez al día	2	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, cansancio, pérdida del apetito <b>Raros:</b> Reacción de hipersensibilidad, acidosis láctica	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Emtricitabina</b>	<i>Emtriva</i>	 Cápsula de 200mg	200mg una vez al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, aumento de los niveles de creatina quinasa, oscurecimiento de la piel <b>Raros:</b> Acidosis láctica, daño hepático	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Lamivudina</b>	<i>Epivir</i>	 Comprimidos de 150* y 300mg	150mg dos veces al día o 300mg una vez al día	2 1	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de cabello, fiebre, insomnio (dificultad para dormir), exantema ( <i>rash</i> ), cansancio, dolor articular <b>Raros:</b> Acidosis láctica, daño hepático	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Zidovudina</b>	<i>Retrovir</i>	 Cápsulas de 100 y 250mg*	250mg dos veces al día	2	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, mareos, debilidad, dolor muscular, pérdida del apetito, fiebre <b>Raros:</b> Alteraciones sanguíneas, lipotrofia, acidosis láctica	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Tenofovir disoproxil</b>	<i>Viread</i>	 Comprimido de 245mg	245mg una vez al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, mareos, niveles bajos de fosfato en sangre, debilidad, exantema ( <i>rash</i> ), dolor de cabeza, dolor estomacal, fatiga, abotargamiento <b>Raros:</b> Problemas renales, adelgazamiento óseo	Tomar con alimentos
<b>Combinaciones de ITIN en dosis fija</b>						
<b>Abacavir / lamivudina</b>	<i>Kivexa</i>	 Comprimido que contiene 600mg de abacavir y 300mg de lamivudina	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor estomacal, cansancio, pérdida del apetito, pérdida de cabello, tos, moqueo nasal, insomnio (dificultad para dormir), <i>rash</i> , dolor articular, dolor muscular, reacción de hipersensibilidad <b>Raros:</b> Acidosis láctica, daño hepático	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Abacavir / lamivudina / zidovudina</b>	<i>Trizivir</i>	 Comprimido que contiene 300mg de abacavir, 150mg de lamivudina y 300mg de zidovudina	Un comprimido dos veces al día	2	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor estomacal, cansancio, pérdida del apetito, pérdida de cabello, tos, moqueo nasal, insomnio (dificultad para dormir), exantema ( <i>rash</i> ), dolor articular, mareos, dolor muscular, reacción de hipersensibilidad <b>Raros:</b> Acidosis láctica, daño hepático, alteraciones sanguíneas, lipotrofia	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Emtricitabina / tenofovir disoproxil</b>	<i>Truvada</i>	 Comprimido que contiene 200mg de emtricitabina y 245mg de tenofovir TDF	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, flatulencia, mareos, niveles bajos de fosfato en sangre, debilidad, <i>rash</i> , dolor de cabeza, aumento de los niveles de creatina quinasa, erupciones, oscurecimiento de la piel, dolor estomacal, dificultad para dormir, abotargamiento <b>Raros:</b> Acidosis láctica, daño hepático, problemas renales, adelgazamiento óseo	Es preferible tomarlo con alimentos, pero puede tomarse con el estómago vacío
<b>Emtricitabina / tenofovir alafenamida</b>	<i>Descovy</i>	 Comprimido que contiene 200mg de emtricitabina y 10mg o 25mg* de tenofovir TAF	Un comprimido al día. La versión de 10mg está recomendada en combinación con algunos inhibidores de la proteasa potenciados	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareos, diarrea, vómitos, dolor estomacal, flatulencia, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), cansancio <b>Raros:</b> Anemia, hinchazón de piel, cara, labios, lengua o garganta, dolor articular	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Lamivudina / zidovudina</b>	<i>Combivir</i>	 Comprimido que contiene 150mg de lamivudina y 300mg de zidovudina	Un comprimido dos veces al día	2	<b>Habituales:</b> Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor estomacal, pérdida de cabello, fiebre, insomnio (dificultad para dormir), tos, moqueo nasal, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), cansancio, dolor articular, mareos, dolor muscular, pérdida del apetito <b>Raros:</b> Alteraciones sanguíneas, lipotrofia, acidosis láctica, daño hepático	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Inhibidores de la integrasa</b>						
<b>Dolutegravir</b>	<i>Tivicay</i>	 Comprimido de 50mg	50mg una vez al día o 50mg dos veces al día si se toma con efavirenz, nevirapina o tipranavir, o en el caso de VIH resistente a los inhibidores de la integrasa	1 o 2	<b>Habituales:</b> Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, exantema ( <i>rash</i> ), picor, vómitos, dolor o molestias estomacales, insomnio, mareos, sueños anómalos, fatiga, flatulencia, aumento de los niveles de enzimas en hígado y músculos <b>Raros:</b> Reacción alérgica, problemas hepáticos	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Raltegravir</b>	<i>Isentress</i>	 Comprimido de 400mg	400mg dos veces al día	2	<b>Habituales:</b> Dolor de cabeza, insomnio (dificultad para dormir) <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave, reacción de hipersensibilidad, sed intensa	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN)</b>						
<b>Efavirenz</b>	<i>Sustiva Stocrin</i>	 Comprimido de 600mg* y cápsula de 200mg	600mg una vez al día	1 o 3	<b>Habituales:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), mareos, alteraciones del sueño, sueños anómalos, problemas de concentración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, ansiedad, depresión, pensamientos suicidas <b>Raros:</b> Psicosis, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave, problemas hepáticos	Tomar con el estómago vacío, preferentemente al acostarse
<b>Etravirina</b>	<i>Intelence</i>	 Comprimido de 100 y 200mg*	200mg dos veces al día	2 o 4	<b>Habituales:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), neuropatía periférica <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave (síndrome de Stevens-Johnson)	Tomar con alimentos
<b>Nevirapina</b>	<i>Viramune</i>	 Comprimido de 200mg	200mg una vez al día durante 2 semanas, después 200mg dos veces al día	2	<b>Habituales:</b> Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor estomacal, diarrea <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave (síndrome de Stevens-Johnson)	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Nevirapina</b>	<i>Viramune liberación prolongada</i>	 Comprimido de 400mg	400mg una vez al día tras un periodo de introducción con nevirapina de liberación no prolongada	1	<b>Habituales:</b> Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor estomacal, diarrea <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave (síndrome de Stevens-Johnson)	Tragar entero. Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Rilpivirina</b>	<i>Edurant</i>	 Comprimido de 25mg	25mg una vez al día	1	<b>Habituales:</b> Insomnio (dificultad para dormir), dolor de cabeza, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ), aumento de los niveles de enzimas hepáticas, depresión, mareos, dolor estomacal, vómitos <b>Raros:</b> Dosis por encima de 25mg pueden provocar alteraciones del ritmo cardíaco	Tomar junto con una comida principal
<b>Inhibidores de la proteasa (IP)</b>						
<b>Atazanavir</b>	<i>Reyataz</i>	 Cápsula de 150, 200 y 300mg*	300mg con 100mg de ritonavir una vez al día	2 o 3 5	<b>Habituales:</b> Náuseas, diarrea, exantema ( <i>rash</i> ), dolor estomacal, dolor de cabeza, insomnio (dificultad para dormir), vómitos, hiperbilirrubinemia, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes <b>Raros:</b> Piedras y problemas en riñón, función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardíaco	Tomar con alimentos
<b>Darunavir</b>	<i>Prezista</i>	 Comprimido de 600, y 800mg*	800mg con 100mg de ritonavir una vez al día o 600mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	2 a 4 5	<b>Habituales:</b> Diarrea, náuseas, exantema ( <i>rash</i> ), dolor estomacal, vómitos, dolor de cabeza, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, fiebre <b>Raros:</b> Función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardíaco	Tomar con alimentos
<b>Darunavir / cobicistat</b>	<i>Rezolsta</i>	 Comprimido que contiene 800mg de darunavir y 150mg de cobicistat	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Diarrea, náuseas, <i>rash</i> , picor, dolor estomacal, vómitos, flatulencia, dolor de cabeza, dolor muscular, problemas óseos, cansancio, pérdida del apetito, sueños anómalos, diabetes <b>Raros:</b> Problemas hepáticos, exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave	Tomar con alimentos
<b>Fosamprenavir</b>	<i>Telzir</i>	 Comprimido de 700mg	700mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	4 5	<b>Habituales:</b> Aumento de los niveles de lípidos, náuseas, vómitos, diarrea, exantema ( <i>rash</i> ), dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, cansancio, hormigueo alrededor de la boca, cambios de la función hepática y del páncreas, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes <b>Raros:</b> Exantema cutáneo ( <i>rash</i> ) grave, alteraciones del ritmo cardíaco	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Lopinavir / ritonavir</b>	<i>Kaletra</i>	 Comprimido que contiene 200mg de lopinavir y 50mg de ritonavir	Dos comprimidos dos veces al día o cuatro comprimidos una vez al día	4	<b>Habituales:</b> Lipodistrofia, aumento de los niveles de enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, debilidad, acidez, dolor de cabeza, aumento del nivel de lípidos, toxicidad hepática, diabetes <b>Raros:</b> Alteraciones del ritmo cardíaco	Tragar entero. Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Atazanavir / cobicistat</b>	<i>Evotaz</i>	 Comprimido que contiene 300mg de atazanavir, 150mg de cobicistat	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Ictericia (color amarillo de piel y/u ojos), náuseas, niveles elevados de azúcar en sangre, aumento del apetito, cambio del gusto, sequedad de boca, dolor de cabeza, mareos, problemas de sueño, vómitos, diarrea, problemas estomacales, hiperbilirrubinemia, <i>rash</i> , lipodistrofia, fatiga <b>Raros:</b> Ritmo cardíaco irregular, <i>rash</i> grave (síndrome de Stevens-Johnson), problemas hepáticos y renales, piedras renales, dolor muscular o debilidad, hinchazón de piel, cara, labios, lengua o garganta	Tomar con alimentos
<b>Inhibidor del CCR5</b>						
<b>Maraviroc</b>	<i>Celsentri</i>	 Comprimidos de 150* y 300mg	300mg dos veces al día o 150mg dos veces al día con un IP potenciado con ritonavir (excepto tipranavir y fosamprenavir) o 600mg dos veces al día con efavirenz o etravirina sin un IP potenciado con ritonavir	2 a 4	<b>Habituales:</b> Náuseas, diarrea, fatiga, dolor de cabeza <b>Raros:</b> Reacción alérgica, problemas hepáticos	Se puede tomar con o sin alimentos
<b>Potenciadores farmacológicos</b>						
<b>Cobicistat</b>	<i>Tybost</i>	 Comprimido de 150mg	Un comprimido al día	1	<b>Habituales:</b> Náuseas, ictericia, nivel elevado de azúcar en sangre, aumento del apetito, alteración del gusto, sequedad bucal, dolor de cabeza, mareos, vómitos, diarrea, dolor estomacal, indigestión, abotargamiento, flatulencia, <i>rash</i> , dificultad para dormir, sueños anómalos, somnolencia, cansancio <b>Raros:</b> Presencia de sangre en la orina, presencia de proteína en la orina, sensación de depresión, picor, dolor muscular, debilidad, piedras renales, fiebre	Tomar con alimentos
<b>Ritonavir</b>	<i>Norvir</i>	 Comprimido de 100mg	'Potenciador' de otros IP: 100 - 200mg una o dos veces al día	1 a 4	<b>Habituales (a dosis reducida):</b> Aumento de los niveles de lípidos <b>Raros:</b> Alteraciones del ritmo cardíaco	Tragar entero. Tomar con alimentos para evitar náuseas

\*Formulación(es) mostrada(s). § Incluyendo la/s cápsula/s de ritonavir.

Algunos fármacos tienen versiones genéricas, por lo que su aspecto puede variar.

El equipo de edición ha adoptado todas las precauciones razonables en la elaboración de esta publicación. Ni NAM ni el equipo de edición se hacen responsables de cualquier imprecisión, error o dato más allá de su control. La inclusión de información sobre cualquier tratamiento o terapia no significa su apoyo por parte de NAM ni de los editores. La información debería utilizarse siempre acompañada por un asesoramiento médico profesional. Traducción al español realizada por el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH).

Esta tabla de fármacos ha sido elaborada por NAM. NAM ofrece información actualizada e imparcial a las personas implicadas en la lucha mundial contra el VIH/sida. En nuestro sitio web puedes encontrar las últimas noticias sobre el VIH y registrarte para recibir las actualizaciones en tu correo electrónico. Cualquier opinión sobre nuestros recursos informativos será bienvenida.

NAM, Acorn House, 314-320 Gray's Inn Road, London WC1X 8DP. Email info@nam.org.uk Web www.aidsmap.com

Agradecemos a Gilead Sciences su financiación a la edición impresa de este recurso. Gilead Sciences no ha tenido ningún tipo de control editorial sobre su contenido.