

Note

Este posibil ca HIV să fie rezistent la medicamente fără ca tu să fi luat vreodată tratament împotriva HIV. Acest lucru se întâmplă pentru că ai luat un virus HIV deja rezistent la medicamente.

Vrei să afli mai multe?

- Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro
- Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: [@BaylorRomania](https://www.facebook.com/BaylorRomania) sau [@FundatiaBaylor](https://www.facebook.com/FundatiaBaylor)
- Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: <https://twitter.com/BaylorRomania>
- Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică
- Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: numărul de telefon **0241691730** sau la adresa de email secretariat@baylor.ro

 **Fundația Baylor
Marea Neagră**
Cei care se străduiesc pot fi ajutați

Copyright @ NAM 2017
www.aidsmap.com

nam aidsmap

Informații de bază Rezistența la medicamente

Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor. Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru persoanele care trăiesc cu HIV din România.



Atunci când HIV este rezistent la medicamente, unele medicamente împotriva HIV nu își mai fac efectul.

1 În fiecare zi HIV încearcă să îți îmbolnăvească noi celule din corp și să se înmulțească în interiorul lor.




2 Medicamentele împotriva HIV împiedică toate aceste lucruri. Dacă întotdeauna îți iei medicamentele la ora exactă și în doza corectă, vei avea foarte puțin HIV în corp.




3 Dacă câteodată uiți să îți iei pastilele sau le iei mai târziu, vei avea mai mult HIV în corpul tău.

- HIV va putea să îți îmbolnăvească noi celule și să se înmulțească.
- HIV poate să devină rezistent la medicamentele împotriva HIV.



4 Dacă HIV devine rezistent la medicamente, medicamentele pe care le iei în acel moment nu vor avea efect. Asta înseamnă că:

- Chiar și atunci când îți iei corect pastilele împotriva HIV, HIV va putea să îți îmbolnăvească celulele și să se înmulțească;
- Vei avea din ce în ce mai mult HIV în corp.



5 Dacă acest lucru se întâmplă, medicul tău va trebui să îți schimbe medicamentele împotriva HIV



! Următoarele medicamente pe care le vei primi s-ar putea să nu fie la fel de ușor de luat și pot să aibă mai multe efecte secundare.

Reține

- Este important să îți iei întotdeauna pastilele la ora exactă și în cantitatea corectă. Dacă nu, HIV poate să devină rezistent la medicamentele pe care le iei.
- Dacă devine rezistent, medicamentele pe care le înghiți nu își mai fac efectul.
- Dacă HIV e rezistent la medicamentele pe care le iei, e posibil ca medicul tău să îți schimbe tratamentul.