

Примечания

Аллергические реакции

- Три противовирусных препарата могут вызывать аллергическую реакцию в первые дни или недели приема (по наблюдениям – у небольшой части пациентов).
- Основным симптомом аллергической реакции – сыпь, но врач обязательно расскажет вам, на какие еще проявления нужно обращать внимание во время лечения.
- Если у вас появились такие симптомы, срочно обратитесь к врачу.
- Эти три препарата: Абакавир (Зиаген, Кивекса, Тризивир), Невирапин (Вирамун) и Этравирин (Интеленс).

Хотите узнать больше?

NAM – общественная организация, работающая в Великобритании в области ВИЧ-инфекции. Мы осуществляем свою деятельность в тесном сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения, исследователями и сотрудниками социальных служб, а также с людьми, непосредственно затронутыми проблемой ВИЧ-инфекции. Мы выпускаем печатные и онлайн-материалы по ВИЧ-инфекции (на английском языке), распространяя информационные ресурсы для людей, живущих с ВИЧ, и специалистов, работающих в области ВИЧ/СПИДа.


Данный материал подготовлен на основе оригинальной публикации NAM, защищенной авторским правом. NAM не несет ответственности за достоверность перевода и его актуальность в местных условиях.

Мы сожалеем, что, будучи англоязычной организацией, не можем общаться с читателями на русском языке, однако на нашем сайте aidsmap.com вы можете найти базу данных с возможностью поиска организаций в самых разных уголках мира. Воспользуйтесь ею, чтобы найти нужную организацию или службу в вашем регионе.

На сайте aidsmap.com вы можете читать и загружать переведенные материалы.

nam www.aidsmap.com

Базовая информация: побочные эффекты



NAM
Адрес: Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE
United Kingdom
Тел.: +44 (0) 20 7840 0050
Факс: +44 (0) 20 7735 5351
Веб-сайт: www.aidsmap.com
Эл. почта: info@nam.org.uk

Информация в данном информационном листке соответствует рекомендациям по лечению и уходу при ВИЧ-инфекции в Европе.

Материал (информация и дизайн) подготовлен при финансовой поддержке профилактической программы 'UK's NHS Pan-London HIV Prevention Programme' и Департамента здравоохранения 'NHS South West Essex'.

Перевод сделан при финансовой поддержке компании «Мерк, Шарп энд Доум» (Merck, Sharp and Dohme).

Copyright ©NAM 2010.
Для перевода, адаптирования или воспроизведения данного информационного листка необходимо обратиться в нашу организацию.

Общественная организация NAM зарегистрирована в Великобритании (регистрационный номер – 1011220).

NAM предоставляет бесплатные информационные ресурсы тысячам людей по всему миру. Если вы хотите сделать пожертвование, посетите нашу страницу: www.aidsmap.com/donate.

Благодарим «СПИД Фонд Восток-Запад» (*AIDS Foundation East-West, AFEW*) за перевод этого материала.

Кратковременные побочные эффекты

Появляются на стадии привыкания организма к новому препарату. Через несколько недель обычно проходят.

● Диарея



● Тошнота



● Усталость



● Беспокойный сон




Устранить эти побочные эффекты можно при помощи специальных лекарств. У некоторых людей они сохраняются дольше, чем у других; в таком случае врач может изменить схему лечения.

Препараты для лечения ВИЧ-инфекции помогают держать вирус под контролем, но одновременно они могут оказывать и другое воздействие на организм. Возникающие в результате этого воздействия нежелательные состояния называются «побочными эффектами».


Длительные побочные эффекты

Проявляются со временем, оказывают пагубное воздействие на организм. Наблюдаются нечасто.


● Врач назначает регулярное обследование печени, почек и костной системы.



● Необходимо постоянно сдавать анализы на определение уровня холестерина и глюкозы. Высокие показатели могут означать повышенный риск развития сердечных заболеваний, диабета, гипертонии или инсульта.



● Перераспределение веса (потеря или набор веса в определенных местах) – эффект, который сегодня встречается все реже. Врачи стараются не назначать препараты, вызывающие этот побочный эффект.



Если проблемы остаются, обычно помогают такие меры, как изменение стиля жизни, прием дополнительных препаратов, назначение другой схемы лечения.

Важные моменты

- Наиболее распространенными побочными эффектами являются кратковременные, которые обычно эффективно устраняются специальными лекарственными средствами.
- Длительные побочные эффекты встречаются все реже.
- Если побочные эффекты доставляют вам неудобства, обсудите эту проблему с врачом. Возможно, вам необходимо изменение схемы лечения.