

NAM
77a Tradescant Road
London SW8 1XJ
Téléphone: +44 (0) 20 3242 0820
Site Internet: www.aidsmap.com
Courriel: info@nam.org.uk

Les informations contenues dans ce livret reflètent les pratiques recommandées en Europe pour le traitement et les soins du VIH.


Contenu & conception financés par MAC AIDS Fund.

Traduction financée par Merck, Sharp & Dohme

nam aidsmap

Le B.A.ba du VIH

Résistance aux médicaments



Première édition 2012
Copyright ©NAM.
Si vous désirez traduire, adapter
ou reproduire cette fiche info,
n'hésitez pas à nous contacter.

Association caritative du Royaume-Uni enregistrée sous le numéro 1011220

Chaque année, NAM offre gratuitement des ressources informatives à des milliers de personnes séropositives. Vous pouvez contribuer dès aujourd'hui en faisant un don sur www.aidsmap.com/donate.

Remerciements à Sylvie Beaumont pour la traduction de ce livret.

Notes

Il est possible d'avoir une résistance aux médicaments sans avoir jamais pris de médicaments anti-VIH. C'est parce qu'un VIH résistant aux médicaments peut vous être transmis, par exemple pendant les rapports sexuels sans préservatifs.

Pour en savoir plus:

NAM est une association communautaire de lutte contre le VIH située au Royaume-Uni. Nous travaillons étroitement avec des experts dans les domaines de la médecine, de la recherche et des soins sociaux ainsi qu'avec les séropositifs. Nous produisons des informations en anglais sous forme imprimée et sur l'Internet, avec des ressources pour les personnes séropositives et pour les professionnels qui travaillent dans le domaine du VIH.

Ce matériel se base sur une publication originale de NAM. NAM ne peut pas être tenu responsable de l'exactitude de la traduction ou de sa pertinence locale.

Nous regrettons qu'en tant qu'association anglaise, nous ne puissions pas correspondre en français. Cependant, vous pouvez consulter sur notre site Internet, aidsmap.com, notre base de données contenant une liste d'associations et d'organismes travaillant dans tous les pays du monde. Vous pouvez l'utiliser pour chercher une association ou un service médical près de chez vous.

Vous pouvez également consulter aidsmap.com pour lire et télécharger d'autres ressources.

Lorsque le VIH est 'résistant aux médicaments', certains médicaments anti-VIH ne marchent pas bien.

1 Chaque jour, le VIH essaie d'infecter des cellules et se multiplie dans l'organisme.



2 Les médicaments anti-VIH empêchent ce processus de se produire. Si vous prenez toujours vos pilules à la bonne heure et en respectant la posologie, il y aura très peu de VIH dans votre organisme.



3 Si vous oubliez parfois vos pilules, ou que vous les prenez tard, il y aura plus de VIH dans votre organisme.

- Le VIH pourra alors infecter de nouvelles cellules et se multiplier.
- Le VIH peut devenir 'résistant aux médicaments'.




4 Si le VIH devient résistant aux médicaments, les médicaments anti-VIH que vous prenez actuellement ne seront pas très efficaces. Ceci signifie que

- Même lorsque vous prenez vos pilules, le VIH pourra toujours infecter les cellules et se multiplier.
- Il y aura de plus en plus de VIH dans votre organisme.



5 Si c'est le cas, il vous faudra changer de traitement.



! La prochaine association médicamenteuse risque de ne pas être si facile à prendre et d'avoir davantage d'effets secondaires.

Les points importants

- C'est important de toujours prendre vos pilules à la bonne heure et en respectant la bonne posologie. Si vous ne le faites pas, le VIH peut devenir résistant.
- Si le VIH devient résistant aux médicaments, certains médicaments anti-VIH ne seront pas très efficaces.
- Si vous avez une résistance à vos médicaments, il vous faudra peut-être les changer.