



Qu'est ce que le *Genvoya*?

Le *Genvoya* est un médicament utilisé pour traiter le VIH. C'est une association de quatre médicaments antirétroviraux combinés en une seule pilule, prise une fois par jour.

Le *Genvoya* combine 150mg d'élvitégravir, 200mg d'emtricitabine et 10mg de ténofovir alafenamide, associés à 150mg de cobicistat dans un comprimé pelliculé vert. Le comprimé porte l'inscription 'GSI' d'un côté et '510' de l'autre.

Comment le *Genvoya* agit-il?

Le *Genvoya* combine quatre médicaments dans une seule pilule. Deux des médicaments (l'emtricitabine et le ténofovir alafenamide) appartiennent à une classe de médicaments appelés INTI (inhibiteurs nucléosidique/nucléotidiques de la transcriptase inverse) et l'élvitégravir est un inhibiteur de l'intégrase. Chaque classe de médicaments attaque le VIH de façon différente. Le Cobicistat est un médicament utilisé comme agent potentialisateur pour accroître l'effet de l'élvitégravir.

L'objectif du traitement anti-VIH est de réduire le taux de VIH (la charge virale) présent dans l'organisme jusqu'à ce qu'il soit indétectable (c'est à dire environ moins de 50 copies de virus par ml de sang). Le traitement anti-VIH et une charge virale indétectable protègent le système immunitaire et réduisent les risques de transmission à autrui.

Comment prendre le *Genvoya*?

Il faut prendre le *Genvoya* une fois par jour avec un repas. Le comprimé doit être avalé entier. ne le mâchez pas, ne l'écrasez pas et ne le coupez pas.

Le traitement anti-VIH est plus efficace s'il est pris tous les jours, si possible à la même heure chaque jour. Faites sonner une alarme, sur votre portable par exemple, pour vous en rappeler. Si vous oubliez une dose de *Genvoya* et que vous réalisez cela dans les 18 heures qui suivent l'heure de prise habituelle, prenez votre dose dès que possible, puis prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Si vous réalisez alors qu'il ne reste plus que 6 heures avant la prochaine dose, ne doublez pas votre dose, sautez simplement la dose que vous avez oubliée et continuez votre routine habituelle.

Si vous êtes malade (vomissements) dans l'heure qui suit la prise de votre comprimé, prenez un autre comprimé; si vous vomissez plus d'une heure après la dose, vous n'avez pas besoin de répéter la dose.

Quels sont les effets secondaires du *Genvoya*?

Tous les médicaments ont des effets secondaires possibles. Avant de commencer à prendre votre médicament, parlez avec votre médecin, votre infirmier(e) ou votre pharmacien(ne) de ce qui peut arriver et des façons de gérer les effets secondaires éventuels.

Une liste complète des effets secondaires, y compris les effets secondaires plus rares, se trouve sur la notice d'information destinée aux patients qui accompagne le *Genvoya*.

Les effets secondaires peuvent être décrits comme suit:

Effets secondaires fréquents – Un effet secondaire qui survient chez au moins une personne sur 100 (plus d'1%) qui prennent ce médicament.

Effets secondaires rares – Un effet secondaire qui survient chez moins d'une personne sur 100 (moins de 1%) qui prennent ce médicament.

Les effets secondaires du *Genvoya* sont (les plus fréquents sont en **caractère gras**):

- **se sentir malade**, vomissements, diarrhées, flatulence
- maux de tête, vertiges, rêves anormaux, fatigue
- éruption cutanée

Est-ce que le *Genvoya* a des interactions avec d'autres médicaments?

Prévenez toujours votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez tout autre médicament. Cela inclut tout ce qui est prescrit par un autre médecin, les médicaments achetés en vente libre en pharmacie, les traitements à base de plantes et de médecine douce, et les drogues dites récréatives ou festives.

Il est dangereux de prendre certains médicaments ou certaines drogues ensemble: les interactions peuvent provoquer une augmentation de leurs concentrations sanguines à un niveau dangereux, ou peuvent les rendre inefficaces. D'autres interactions médicamenteuses sont moins dangereuses mais doivent tout de même être prises au sérieux. Si le taux d'un des médicaments est affecté, votre dose devra peut-être être modifiée. Ceci doit être uniquement être fait sur l'avis de votre médecin.

Si vous prenez du *Genvoya* c'est important de consulter votre médecin VIH ou votre pharmacien avant de prendre un médicament appartenant aux groupes suivants:

- antibiotiques
- médicaments antiépileptiques
- médicaments pour l'hypertension artérielle
- médicaments pour réduire le taux de cholestérol (statines)
- antidépresseurs
- anticoagulants (médicaments pour diluer le sang)
- médicaments contre l'insomnie ou tranquillisants
- metformine (un comprimé pour traiter le diabète)
- médicaments antiarythmiques (pour les troubles du rythme cardiaque)
- contraceptifs oraux (contrôle des naissances)
- stéroïdes en pulvérisateur nasal ou inhalateur – certains stéroïdes peuvent s'accumuler dans l'organisme et provoquer des effets secondaires graves et ne doivent pas être pris avec le *Genvoya*; vérifiez avant de prendre des stéroïdes de cette façon
- herbes médicinales – le millepertuis en particulier doit être évité
- médicaments contre la dysfonction érectile – les concentrations de certains de ces médicaments peuvent augmenter dangereusement et une dose réduite peut être recommandée

Le calcium, le fer, le magnésium ou l'aluminium peuvent vous empêcher d'absorber le *Genvoya* correctement – tous les compléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux et les antiacides doivent être pris au moins 4 heures avant ou après le *Genvoya*.

La notice d'information destinée aux patients qui accompagne votre *Genvoya* a une liste complète des médicaments à éviter.

Puis-je prendre le *Genvoya* pendant la grossesse?

Le *Genvoya* n'est pas recommandé aux femmes pendant la grossesse.

Si vous envisagez d'avoir un bébé, ou si vous pensez être enceinte, parlez-en à votre médecin dès que possible pour déterminer quelle serait la meilleure association de médicaments pour vous. Il est important de prendre un traitement antirétroviral pendant la grossesse pour éviter de passer le VIH de la mère à l'enfant.

Parlez à votre médecin

Si vous avez des inquiétudes au sujet de votre traitement ou de tout autre aspect de votre santé, il est important d'en parler. Par exemple si vous avez un symptôme ou un effet secondaire susceptible d'être dû à votre traitement, ou si vous trouvez difficile de prendre vos médicaments tous les jours, un des membres de votre équipe soignante sera en mesure de vous aider.

Développer une relation de confiance avec un médecin prend du temps. Vous vous sentez peut être très à l'aise pour parler avec votre médecin, mais certaines personnes trouvent cela plus difficile, surtout pour parler de sexe, de santé mentale ou de symptômes qui les embarrassent. Il est également facile d'oublier de quoi on voulait parler.

Se préparer pour un rendez-vous peut être très utile. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire. Vous trouverez peut-être utile de parler à quelqu'un d'autre en premier, ou de prendre des notes et de les amener à votre rendez-vous. Notre outil en ligne Talking points (points de discussion) pourra peut-être vous aider à préparer votre prochain rendez-vous – visitez www.aidsmap.com/talking-points

Les éditeurs ont pris toutes les précautions raisonnables dans la production de cette publication. Ni NAM, ni les éditeurs, ne peuvent être tenus responsables des inexactitudes ou faits inexacts qui échappent à leur contrôle. L'inclusion d'informations sur un traitement ou une thérapie ne constitue pas une validation de ce traitement ou de cette thérapie par NAM ou ces éditeurs.

Nous recommandons que ces informations soient toujours utilisées conjointement avec un avis médical professionnel.

Cette fiche d'information est produite par une association appelée NAM et a été examinée par les membres de nos comités de bénévoles séropositifs et de professionnels de la santé.

NAM, Acorn House, 314-320 Gray's Inn Road, Londres WC1X 8DP.

Email info@nam.org.uk
Web www.aidsmap.com

Traduction de Sylvie Beaumont

Publié en mars 2017.

A réviser en Mars 2020.