

Note

Reazioni allergiche

- È stato riportato che una piccola percentuale di persone che assumono tre farmaci hanno una reazione allergica nei primi giorni o settimane di trattamento.
- Il sintomo più comune è un'eruzione cutanea, ma è opportuno informarsi presso il proprio medico per avere informazioni più dettagliate.
- Se dovessero manifestarsi questi sintomi, è bene consultare subito un medico.
- Le sostanze in questione sono abacavir (*Ziagen, Kivexa, Trizivir*), nevirapina (*Viramune*) ed etravirina (*Intence*).

Per saperne di più

NAM è un'organizzazione di comunità per la lotta contro l'HIV con sede nel Regno Unito. Lavoriamo a stretto contatto con professionisti nel campo della medicina, della ricerca e dell'assistenza sociale, oltre che con persone direttamente colpite dall'HIV. Produciamo materiale informativo in lingua inglese per la distribuzione in versione cartacea o via web, destinato sia alle persone sieropositive che agli operatori che lavorano nel campo dell'HIV.


Questo materiale è basato su una pubblicazione originale NAM protetta da copyright. NAM non è responsabile dell'accuratezza della traduzione o della sua rilevanza a livello locale.

Siamo spiacenti, in quanto organizzazione di lingua inglese, di non poter intrattenere una corrispondenza in italiano. Sul nostro sito web aidsmap.com è però possibile consultare un database dei servizi HIV di tutto il mondo per trovare l'organizzazione o il servizio sanitario locale più vicino a voi.

Su aidsmap.com potrete inoltre trovare materiale tradotto da leggere o scaricare.

nam www.aidsmap.com

prime informazioni effetti collaterali



NAM
Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE
Regno Unito
Tel: +44 (0) 20 7840 0050
Fax: +44 (0) 20 7735 5351
Sito web: www.aidsmap.com
Email: info@nam.org.uk

Contenuti e grafica sovvenzionati dal NHS Pan-London HIV Prevention Programme e NHS South West Essex (Regno Unito).

Traduzione sovvenzionata da Merck, Sharp & Dohme.

Copyright® NAM 2010
Per tradurre, adattare o riprodurre questo documento si prega di contattarci.

Numero di registrazione nel Regno Unito: 1011220

NAM fornisce ogni anno materiale informativo a migliaia di persone a titolo completamente gratuito. Chi desiderasse fare una donazione, può visitare www.aidsmap.com/donate.

Le informazioni qui contenute riflettono le pratiche attualmente raccomandate per la cura e il trattamento dell'HIV in Europa.

Si ringrazia LILA per la traduzione di questa pubblicazione.



www.lila.it

I farmaci anti-HIV, indispensabili per tenere sotto controllo il virus, possono purtroppo avere delle ripercussioni sull'organismo. Per 'effetti collaterali' si intendono appunto i vari effetti indesiderati provocati dai farmaci.

Effetti collaterali a breve termine

Gli effetti collaterali più comuni insorgono semplicemente perché l'organismo si sta abituando al nuovo farmaco. In genere, infatti, scompaiono entro qualche settimana.

● Diarrea



● Malesseri



● Stanchezza



● Disturbi del sonno




Si può tentare di contrastare questo genere di effetti collaterali con un apposito trattamento farmacologico. Se però dovessero persistere, è bene valutare insieme al medico l'eventualità di cambiare o modificare il trattamento.


Effetti collaterali a lungo termine

Meno comuni sono gli effetti collaterali che hanno ripercussioni a lungo termine sulla salute.


● È bene far controllare periodicamente lo stato di salute di fegato, reni e ossa per sincerarsi che vada tutto bene.



● Vanno tenuti sotto controllo anche il colesterolo e la glicemia: se i loro valori sono superiori alla norma, infatti, potrebbe aumentare il rischio di cardiopatie, diabete, ipertensione o ictus.



● Le alterazioni dell'aspetto fisico (anomala perdita o accumulo di grasso in determinate parti del corpo) sono meno frequenti di una volta. I medici tendono oggi a evitare di prescrivere i farmaci noti per causare questo tipo di problemi.



Se si presenta un disturbo, può essere il caso di cambiare lo stile di vita, assumere farmaci specifici o modificare il trattamento anti-HIV.

In primo piano

- **Gli effetti collaterali più comuni non sono persistenti e possono spesso essere contrastati con un trattamento farmacologico.**
- **Gli effetti collaterali a lungo termine sono invece meno comuni.**
- **Se gli effetti collaterali dovessero essere debilitanti, è opportuno consultare il proprio medico. Potrebbe essere il caso di cambiare il trattamento.**