

Note

Che succede se non si prendono i farmaci anti-HIV nei tempi giusti?

- Saltando più di una dose al mese, aumenta il rischio che il trattamento perda efficacia.
- Di conseguenza aumenta la quantità di virus nell'organismo, il che va a indebolire sempre più il sistema immunitario.
- Il virus, replicandosi, può creare copie 'resistenti' ai farmaci anti-HIV. Ciò significa che l'efficacia del trattamento diminuisce.
- In tal caso, può darsi sia necessario cambiare i farmaci anti-HIV, ed è possibile che la nuova terapia sia più difficile da seguire e abbia più effetti collaterali.

Per saperne di più

NAM è un'organizzazione di comunità per la lotta contro l'HIV con sede nel Regno Unito. Lavoriamo a stretto contatto con professionisti nel campo della medicina, della ricerca e dell'assistenza sociale, oltre che con persone direttamente colpite dall'HIV. Produciamo materiale informativo in lingua inglese per la distribuzione in versione cartacea o via web, destinato sia alle persone sieropositive che agli operatori che lavorano nel campo dell'HIV.

Questo materiale è basato su una pubblicazione originale NAM protetta da copyright. NAM non è responsabile dell'accuratezza della traduzione o della sua rilevanza a livello locale.

Siamo spiacenti, in quanto organizzazione di lingua inglese, di non poter intrattenere una corrispondenza in italiano. Sul nostro sito web aidsmap.com è però possibile consultare un database dei servizi HIV di tutto il mondo per trovare l'organizzazione o il servizio sanitario locale più vicino a voi.

Su aidsmap.com potrete inoltre trovare materiale tradotto da leggere o scaricare.

prime informazioni osservanza della terapia



NAM
Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE
Regno Unito
Tel: +44 (0) 20 7840 0050
Fax: +44 (0) 20 7735 5351
Sito web: www.aidsmap.com
Email: info@nam.org.uk

Contenuti e grafica sovvenzionati dal NHS Pan-London HIV Prevention Programme e NHS South West Essex (Regno Unito).

Traduzione sovvenzionata da Merck, Sharp & Dohme.

Copyright® NAM 2010
Per tradurre, adattare o riprodurre questo documento si prega di contattarci.

Numero di registrazione nel Regno Unito: 1011220

NAM fornisce ogni anno materiale informativo a migliaia di persone a titolo completamente gratuito. Chi desiderasse fare una donazione, può visitare www.aidsmap.com/donate.

Le informazioni qui contenute riflettono le pratiche attualmente raccomandate per la cura e il trattamento dell'HIV in Europa.


Si ringrazia LILA per la traduzione di questa pubblicazione.




Perché il trattamento anti-HIV sia efficace, è fondamentale osservare scrupolosamente le prescrizioni per l'assunzione dei farmaci, senza saltare dosi.




1 È essenziale assumere i farmaci che compongono il trattamento anti-HIV nei tempi e nelle dosi indicate. Per esempio, se un farmaco va preso due volte al giorno, significa che una dose copre circa dodici ore.




2 Bisogna quindi assumere una nuova dose **prima** che l'efficacia della precedente sia del tutto esaurita.



3 Se **si ritarda**, per un certo periodo di tempo il farmaco nell'organismo **non sarà sufficiente**. L'HIV potrà quindi infettare altre cellule.



4 Se invece i farmaci vengono assunti **in tempo**, la quantità di farmaco in circolo si manterrà sempre sufficiente a **tenere sotto controllo il virus**.



In primo piano

- È fondamentale assumere tutti i farmaci prescritti dal trattamento anti-HIV nei giusti tempi e nelle giuste dosi.
- Un'assunzione regolare assicura che nell'organismo si mantenga sempre una quantità di farmaci sufficiente a tenere il virus sotto controllo.
- Se non si osservano le prescrizioni, c'è il rischio che l'HIV col tempo diventi più difficile da trattare.