

Notities

Allergische reacties

- Met drie anti-HIV medicijnen krijgt een klein aantal mensen een allergische reactie in de eerste dagen of weken van het gebruik.
- Het meest voorkomende symptoom is een huiduitslag maar je dokter zal je meer gedetailleerde informatie geven waar je op moet letten.
- Als je deze symptomen krijgt is het van belang dat je met spoed medische hulp krijgt.
- De drie medicijnen zijn abacavir (*Ziagen, Kivexa, Trizivir*), nevirapine (*Viramune*) en etravirine (*Intence*).

Meer te weten komen?

NAM is een gemeenschappelijke HIV organisatie, gevestigd in Groot-Brittanië. We werken nauw samen met experts op het gebied van geneeskunde, onderzoek en sociale zorg, en met mensen die persoonlijk zijn geraakt door HIV. We produceren gedrukt en online HIV informatie in Engels inclusief materiaal voor mensen die leven met HIV en voor professionals die werken met HIV.


Dit materiaal is gebaseerd op een originele publicatie onder copyright van NAM. NAM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid of de lokale toepasbaarheid hiervan.

Het spijt ons dat, als een Engels-sprekende organisatie, we niet in het Nederlands kunnen corresponderen. Maar onze website aidsmap.com bevat een doorzoekbare database van onze diensten over de gehele wereld. Je kunt hem gebruiken om een organisatie of gezondheidszorg instelling bij jou in de buurt te vinden.

Je kan ook aidsmap.com bezoeken om ons overige vertaalde materiaal te lezen en te downloaden.

nam www.aidsmap.com

de basis bijwerkingen



NAM
Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE

Phone: +44 (0) 20 7840 0050
Fax: +44 (0) 20 7735 5351
Website: www.aidsmap.com
E-mail: info@nam.org.uk

De informatie in deze folder geeft HIV behandeling en zorg weer, zoals aanbevolen in Europa.

Inhoud & ontwerp gefinancierd door het UK's NHS Pan-London HIV Preventie Programma en NHS South West Essex

Vertaling gefinancierd door Merck, Sharp and Dohme

Copyright ©NAM 2010.
Als je deze factsheet wilt vertalen, aanpassen of reproduceren, neem dan contact met ons op.

UK geregistreerd erkend goed doel onder nummer 1011220

NAM maakt elk jaar informatie materiaal beschikbaar aan duizenden mensen, complete kostenloos. Als je wilt doneren, bezoek dan www.aidsmap.com/donate.

Met dank aan R. Steingrover voor het vertalen van dit materiaal.

Behalve HIV onder controle houden, kunnen anti-HIV medicijnen ook andere effecten in het lichaam opwekken. Extra of ongewenste effecten zijn 'bijwerkingen'.

Korte termijn bijwerkingen

De meeste algemene bijwerkingen treden op als gevolg van het moeten wennen aan een nieuw medicijn. Na enkele weken verdwijnen deze bijwerkingen meestal.


● Diarree



● Misselijkheid



● Moe zijn



● Slecht slapen




Vaak kun je andere medicijnen nemen om deze bijwerkingen te verminderen. Bij een klein deel van de mensen gaan deze bijwerkingen niet vanzelf over. Als dit het geval is kun je met je dokter spreken over het veranderen van medicijnen.


Lange termijn bijwerkingen

Bijwerkingen met lange termijn gevolgen voor je gezondheid komen minder vaak voor.


● Zorg dat je kliniek regelmatig controles doet van je lever, nieren en botten om zeker te zijn dat alles in orde is.



● Ook suiker en cholesterol moeten getest worden. Verhoogde waarden kunnen betekenen dat er een verhoogde kans bestaat op hartkwalen, suikerziekte, verhoogde bloeddruk of een beroerte.



● Veranderingen in de vorm van je lichaam (afname of toename van vet op bepaalde plaatsen) komen minder voor dan vroeger. Dokters vermijden nu het gebruik van medicijnen die deze problemen veroorzaken.



Als er een probleem is, kan het de moeite waard zijn om je levensstijl te veranderen, een aanvullende behandeling te starten of je HIV behandeling te veranderen.

Belangrijke punten

- De meest voorkomende bijwerkingen zijn van korte duur en kunnen vaak met medicijnen worden behandeld.
- Lange termijn bijwerkingen treden minder vaak op.
- Als je problemen hebt door bijwerkingen, bespreek ze met je dokter. Het kan mogelijk zijn om je behandeling te veranderen.