

NAM

77a Tradescant Road
London SW8 1XJ
Puhelin: +44 (0) 20 3242 0820
Verkkosivusto:
www.aidsmap.com
S-posti: info@nam.org.uk

Isossa-Britanniassa rekisteröity
hyväntekeväisyysjärjestö numero 1011220

Tässä esitteessä annetut tiedot heijastavat hivin
hoitokäytäntöä ja hoito-ohjeita Euroopassa.

Sisällön ja ulkoasun suunnittelun on rahoittanut
Ison-Britannian kansallisen terveysjärjestön NHS:n
Pan-London HIV Prevention Programme ja NHS
South West Essex

Käännöksen on rahoittanut Merck, Sharp and Dohme

Copyright NAM 2013


Jos tarvitset lisäkappaleita tästä tiedotteesta tai jos
haluat kääntää, mukauttaa tai kopioida tiedotteen,
ota yhteyttä meihin.

Tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille

Positiiviset ry, HivFinland
Malminkatu 24 C
00100 Helsinki
Puhelin: (09) 6925 441
Verkkosivusto: positiiviset.fi
S-posti: positiiviset@positiiviset.fi

Hiv-tukikeskus, Finnish AIDS council
hivtukikeskus.fi
Vaihe 0207 465 700
Neuvonta ja ajanvaraus hiv-testiin 0207 465 705

Perusasiat Tuberkuloosi ja hiv



Muistiinpanoja

Yleisin syy **heikentyneeseen immuunijärjestelmään** hiviä sairastavilla ihmisillä on se, etteivät he käytä hiv-lääkkeitä. Immuunijärjestelmä voi joskus heikentyä myös muun sairauden, vähäisen ravinnonsaannin, heikkojen asuinolojen, raskauden tai hyvin nuoren iän tai vanhuuden takia.

Haluatko tietää enemmän?

NAM on Isossa-Britanniassa toimiva hiv-järjestö. Toimimme läheisessä yhteistyössä lääketieteen, tutkimuksen ja sosiaalialan asiantuntijoiden sekä hivin kanssa elävien ihmisten kanssa. Tuotamme painettua ja verkkopohjaista tietoa hivistä englanniksi sekä hivin kanssa eläville ihmisille että sen parissa työskenteleville ammatti-ihmisille.

Tämä materiaali perustuu alkuperäiseen NAM:n tekijänoikeuksien suojaamaan julkaisuun. NAM ei ole vastuussa käännöksen virheettömyydestä eikä sen sopivuudesta paikalliseen käyttöön.


Valitettavasti englanninkielisenä järjestönä emme pysty kommunikoimaan suomeksi. Verkkosivuillamme **aidsmap.com** on kuitenkin hakutoiminnolla varustettu tietokanta palveluista ympäri maailman. Voit etsiä sen avulla lähelläsi olevan järjestön tai terveyspalvelun.

Voit myös lukea ja ladata muita käännettyjä materiaalejamme vieraillemalla verkkosivuillamme **aidsmap.com**.

Hiv-tartunnan saaneiden edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö Suomessa Positiiviset ry **positiiviset.fi**.

Jos hiv on heikentänyt immuunijärjestelmäsi, olet alttiimpi tuberkuloosille.

1 Tuberkuloosi on bakteeriperäinen tartunta.




2 Bakteerit siirtyvät ihmisestä toiseen ilman välityksellä. Ne voivat päästä elimistösi hengityksen kautta.

3 Bakteerit tartuttavat yleensä keuhkot, mutta ne voivat tartuttaa myös muita elimistön osia (kuten luita tai niveliä).



4 Bakteerit eivät sairastuta kaikkia ihmisiä. Sairastuminen riippuu siitä, kuinka vahva immuunijärjestelmäsi on.




Jos immuunijärjestelmäsi on hyvin vahva, se tappaa bakteerit.



Jos immuunijärjestelmäsi on melko vahva, se ei tapa bakteereja, mutta pitää ne hallinnassa etkä tunne itseäsi sairaaksi. Tätä kutsutaan "piileväksi tartunnaksi".



Jos immuunijärjestelmäsi on heikko, se ei pysty hillitsemään bakteereita. Tuberkuloosibakteerit kasvavat ja saavat sinut sairastumaan. Tätä kutsutaan "aktiiviseksi tartunnaksi".



Tuberkuloosin oireet




Yskä, joka kestää yli kolme viikkoa



Ruokahaluttomuus



Yöhikoilu



Kuume




Väsymys



Painonlasku

5 Bakteerit saa tapettua tuberkuloosilääkkeillä.



6 Voit vahvistaa immuunijärjestelmäsi hiv-lääkkeillä.



Tärkeää

● Tuberkuloosin aiheuttajina ovat ilman kautta tarttuvat bakteerit.

● Hoitamaton hiv heikentää immuunijärjestelmäsi. Sen takia voit sairastua tuberkuloosiin muita todennäköisemmin.

● Tuberkuloosi on hyvin vakava sairaus, mutta siihen on hoitokeino.