


הערות

תגובות אלרגיה

- בנטילת שלוש תרופות אנטי-HIV, מספר מצומצם של אנשים סובלים מתגובה אלרגית במהלך הימים או השבועות הראשונים.
- הסימפטום השכיח ביותר הוא תפרחת, אולם הרופא המטפל יספק לך מידע מפורט לגבי הדברים שיש לתת עליהם את הדעת.
- במידה ויש לך תסמינים אלו, עליך לפנות בדחיפות לקבלת טיפול רפואי.
- התרופות הן אבאקוויר (Ziagen, Kivexa, Trizivir) נוויראפין (Viramune) ואטראווין (Intelence).

היסודות תופעות לוואי



רוצה לקבל מידע נוסף?

NAM הוא ארגון HIV קהילתי, בבריטניה. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מומחים בתחומי הרפואה, המחקר והעבודה הסוציאלית, ועם אנשים שנפגעו באופן אישי מ-HIV. אנו מפיקים מידע מודפס ובאתר האינטרנט בנושא HIV, בשפה האנגלית, הכולל מקורות מידע עבור אנשים החיים עם HIV ועבור מומחים העוסקים ב-HIV.

חומר זה מבוסס על פרסום זכויות יוצרים מקורי של NAM. NAM איננה נושאת באחריות על דיוק התרגום או על הרלוונטיות המקומית.

כארגון דובר אנגלית, אנו מתנצלים על כך שאיננו יכולים להתכתב בעברית. אולם, אתר האינטרנט שלנו aidsmap.com כולל מאגרי מידע על נותני שירות בכל העולם. ניתן להתשמש בו למצוא ארגון או שירותי בריאות מקומי.

ניתן לבקר באתר aidsmap.com על מנת לקרוא ולהוריד קבצים מתורגמים אחרים.

מספר עמותה רשומה בבריטניה
1011220

בכל שנה NAM מספקת מקורות מידע לאלפי אנשים בחינם. במידה ותרצה/י להרים תרומה, אנא פנה/י לאתר האינטרנט www.aidsmap.com/donate

תודה ל-JAT על תרגום מקור מידע זה.



האינפורמציה בחוברת זו משקפת את דרך הפעולה המומלצת לטיפול והשגחה על HIV באירופה.

תוכן ועיצוב ממומן ע"י תוכנית מניעת HIV בפאן-לונדון, של שירותי הבריאות הלאומיים של בריטניה ושירותי הבריאות הלאומיים בדרום מערב אסקס התרגום ממומן ע"י מרק, שארפ ודוהם

NAM זכויות יוצרים 2010
במידה ותרצה/י לתרגם, לעבד או לשכפל מסמך זה, אנא צור/י עמנו קשר.

NAM

בית לינקולן
רחוב בריקסטון 1
לונדון SW9 6DE

טלפון:

+44 (0) 20 7840 0050

פקס:

+44 (0) 20 7735 5351

אתר אינטרנט:


www.aidsmap.com

כתובת דוא"ל:

info@nam.org.uk

תופעות לוואי קצרות-טווח

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר מתרחשות כתוצאה מהסתגלות הגוף לתרופה חדשה. לאחר מספר שבועות, תופעות לוואי אלו בדרך-כלל נעלמות.



לעיתים קרובות ניתן ליטול תרופות אחרות להגבלת תופעות הלוואי הללו. מספר מצומצם של אנשים מגלים כי תופעות הלוואי אינן נעלמות. במקרה כזה, ניתן להיוועץ עם הרופא המטפל על החלפת הטיפול.

בנוסף לבקרה ולשליטה על HIV, תרופות האנטי-HIV משפיעות בדרכים אחרות על הגוף שלנו. השפעות לא רצויות נוספות נקראות "תופעות לוואי".


תופעות לוואי לטווח-ארוך

תופעות לוואי אשר יש להן השלכות ארוכות טווח על בריאותך, הן פחות נפוצות.


נקודות חשובות

- תופעות הלוואי השכיחות ביותר הן לטווח-הקצר ולעיתים קרובות ניתן לטפל בהן באמצעות תרופות.
- תופעות לוואי ארוכות-טווח הן נדירות יותר.
- במידה ותופעות הלוואי גורמות לבעיות, יש להיוועץ ברופא המטפל. יתכן וניתן להחליף את הטיפול שלך.


- שינויים במבנה הגוף (עלייה או ירידה ברמת השומן במקומות מסויימים) הינם פחות נפוצים מבעבר. רופאים משתדלים להמנע משימוש בתרופות העשויות לגרום לבעיות אלו.



- יש לבדוק את רמת הכולסטרול ורמת הגלוקוז שלך. רמות גבוהות יכולות להצביע על סיכון גבוה למחלות לב, סכרת, לחץ דם גבוה או התקף לב.



- עליך לוודא כי המרפאה שלך מבצעת בדיקות שגרתיות בכבד, בכליות ובעצמות בכדי לבדוק שהכל תקין.



במידה וקיימת בעיה, רצוי לשנות את אורח החיים שלך, לקבל טיפול נוסף או להחליף את סוג טיפול ה-HIV.