



*Formulación(es) mostrada(s) en la imagen.

§ Incluyendo las cápsulas de ritonavir.

Esta tabla de fármacos ha sido elaborada originalmente por la organización británica NAM, que ha autorizado a su contraparte en España, el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (GT-T-VH), a realizar la traducción, adaptación y difusión. Tanto el equipo de edición como de traducción han adoptado todas las precauciones razonables en la elaboración de esta publicación. Ni el equipo de edición ni el de traducción se hacen responsables de cualquier imprecisión, error o dato más allá de su control. **Diciembre de 2019.**

Nombre genérico	Nombre comercial	Formulación	Dosis estándar en adultos	Comprimidos/ día	Principales efectos secundarios	Restricciones alimentarias	
Regímenes en un único comprimido							
Bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida	Biktarvy		Comprimido que contiene 50mg de bictegravir, 200mg de emtricitabina, 25mg de tenofovir alafenamida	Un comprimido al día	1	Habituales: Depresión, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, cansancio Raros: Conducta suicida	Se puede tomar con o sin alimentos
Darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida	Symtuza		Comprimido que contiene 800mg de darunavir, 150mg de cobicistat, 200mg de emtricitabina, 10mg de tenofovir alafenamida	Un comprimido al día	1	Habituales: Reacción alérgica (hipersensibilidad), pérdida de apetito, sueños anómalos, diabetes, aumento de los niveles de lípidos o enzimas pancreáticas o hepáticas o de creatinina, dolor de cabeza, mareo, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, abotargamiento, indigestión, flatulencia, hinchazón facial, erupción cutánea, picor, dolor articular o muscular, cansancio, sensación de debilidad Raros: Erupción cutánea grave con fiebre (síndrome de Stevens-Johnson)	Tomar con alimentos
Dolutegravir/abacavir/lamivudina	Triumeq		Comprimido que contiene 50mg de dolutegravir, 600mg de abacavir, 300mg de lamivudina	Un comprimido al día	1	Habituales: Dificultad para dormir, somnolencia, sueños anómalos, depresión, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, fatiga, erupción cutánea, picor, vómitos, dolor estomacal, mareo, pérdida de cabello, flatulencia, dolor abdominal, abotargamiento, dolor y molestias musculares, dolor articular, nariz irritada o secreción nasal, tos, indigestión, reflujo gástrico y pérdida de apetito Raros: Reacción alérgica (hipersensibilidad), acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), pensamientos suicidas	Se puede tomar con o sin alimentos
Dolutegravir/rilpivirina	Juluca		Comprimido que contiene 50mg de dolutegravir y 25mg de rilpivirina	Un comprimido al día	1	Habituales: Disminución del recuento de glóbulos blancos, hemoglobina o plaquetas, aumento del colesterol total o el LDL, reducción del apetito, aumento de los triglicéridos, dificultad para dormir, sueños anómalos, depresión, ánimo depresivo, ansiedad, dolor de cabeza, mareo, letargo, náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómitos, flatulencia, sequedad de boca, aumento de las enzimas hepáticas o bilirrubina o creatinina fosfoquinasa o lipasa o amilasa pancreática, erupción cutánea, picor, fatiga Raros: Pensamientos o conductas suicidas	Tomar junto con una comida
Doravirina/lamivudina/emtricitabina disoproxil fumarato	Delstrigo		Comprimido que contiene 100mg de doravirina, 300mg de lamivudina, 245mg de tenofovir disoproxil fumarato	Un comprimido al día	1	Habituales: Sueños anómalos, dificultad para dormir, pesadillas, depresión, dolor de cabeza, mareo, letargo, tos, nariz irritada o secreción nasal, náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómitos, pérdida de cabello, erupción cutánea, problemas musculares, fatiga, fiebre Raros: Acidosis láctica (demasiado ácido láctico en sangre), pensamientos suicidas, hepatitis, fallo o daño renal agudo	Se puede tomar con o sin alimentos
Efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Comprimido que contiene 600mg de efavirenz, 200mg de emtricitabina, 245mg de tenofovir disoproxil fumarato	Un comprimido al día	1	Habituales: Dificultad para dormir, cansancio, sueños anómalos, problemas de concentración, mareo, erupción cutánea, picor, náuseas, vómitos, diarrea, sequedad de boca, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, aumento de los niveles de enzimas hepáticas, amilasa o creatina quinasa, oscurecimiento de la piel, niveles bajos de fosfato en la sangre, debilidad, dolor de estómago, abotargamiento, flatulencia, indigestión, pérdida de apetito, aumento de los niveles de azúcar y triglicéridos en sangre Raros: Reacción alérgica (hipersensibilidad), acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), psicosis, inflamación hepática	Tomar con el estómago vacío, preferentemente al acostarse
Elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida	Genvoya		Comprimido que contiene 150mg de elvitegravir, 150mg de cobicistat, 200mg de emtricitabina, 10mg de tenofovir alafenamida	Un comprimido al día	1	Habituales: Sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, flatulencia, erupción cutánea, cansancio Raros: Depresión, hinchazón de la piel, cara, labios, lengua o garganta	Tomar con alimentos
Elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato	Stribild		Comprimido que contiene 150mg de elvitegravir 150mg de cobicistat 200mg de emtricitabina 245mg de tenofovir disoproxil fumarato	Un comprimido al día	1	Habituales: Náuseas, diarrea, vómitos, sueños anómalos, dolor de cabeza, fatiga, mareo, insomnio, erupción cutánea, picor, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, estreñimiento, somnolencia, debilidad, oscurecimiento de la piel, recuento bajo de glóbulos blancos, niveles bajos de fosfato en la sangre, niveles elevados de triglicéridos y azúcar en sangre, niveles elevados de enzimas hepáticas, amilasa, creatinina o creatina quinasa Raros: Acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), fallo renal	Tomar con alimentos
Rilpivirina/emtricitabina/tenofovir alafenamida	Odefsey		Comprimido que contiene 25mg de rilpivirina, 200mg de emtricitabina, 25mg de tenofovir alafenamida	Un comprimido al día	1	Habituales: Dificultad para dormir, sueños anómalos, depresión, dolor de cabeza, mareo, pérdida de apetito, náuseas, dolor abdominal, vómitos, sequedad de boca, indigestión, flatulencia, diarrea, erupción cutánea, cansancio, recuento bajo de glóbulos blancos o rojos, recuento bajo de plaquetas, niveles elevados de lípidos o de enzimas pancreáticas o hepáticas Raros: Erupción cutánea grave y fiebre	Tomar con alimentos
Rilpivirina/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato	Eviplera		Comprimido que contiene 25mg de rilpivirina, 200mg de emtricitabina, 245mg de tenofovir disoproxil fumarato	Un comprimido al día	1	Habituales: Aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, pérdida de apetito, depresión, trastornos del sueño, sueños anómalos, somnolencia, náuseas, vómitos, diarrea, mareo, insomnio, dolor de cabeza, debilidad, erupción cutánea, picor, dolor abdominal, sequedad de boca, fatiga, abotargamiento, flatulencia, alteraciones de la función renal, aumento de los niveles de enzimas hepáticas, amilasa o creatina quinasa, niveles bajos de fosfato en la sangre, oscurecimiento de la piel, recuento bajo de glóbulos blancos Raros: Acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), fallo renal	Tomar con alimentos
Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido/nucleótido (ITIN/ITINT)							
Emtricitabina	Emtriva		Cápsula de 200mg	200mg una vez al día	1	Habituales: Náuseas, diarrea, vómitos, indigestión, dolor de cabeza, mareo, debilidad, fatiga, aumento de los niveles de enzimas hepáticas, amilasa o creatina quinasa, aumento de los niveles de azúcar y triglicéridos en sangre, erupción cutánea, picor, oscurecimiento de la piel, insomnio, sueños anómalos Raros: Acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), daño hepático	Se puede tomar con o sin alimentos
Lamivudina Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Comprimidos de 150 y 300mg	150mg dos veces al día o 300mg una vez al día	2 1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, sensación general de malestar, tos, secreción nasal, dolor abdominal, pérdida de cabello, fiebre, insomnio, erupción cutánea, cansancio, dolor muscular y articular Raros: Acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), daño hepático	Se puede tomar con o sin alimentos
Tenofovir disoproxil fumarato Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Comprimido de 245mg	245mg una vez al día	1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, mareo, niveles bajos de fosfato en la sangre, elevación de las enzimas hepáticas, debilidad, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor abdominal, abotargamiento Raros: Problemas renales, adelgazamiento óseo	Tomar con alimentos
Zidovudina Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Cápsula de 250mg	250mg dos veces al día	2	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, sensación general de malestar, dolor de estómago, fatiga, dolor de cabeza, mareo, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito Raros: Trastornos sanguíneos, lipodistrofia, acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), problemas hepáticos, pancreatitis	Se puede tomar con o sin alimentos
Combinaciones de ITIN/ITINT en dosis fija							
Abacavir/lamivudina Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Comprimido que contiene 600mg de abacavir y 300mg de lamivudina	Un comprimido al día	1	Habituales: Dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de cabello, insomnio, cansancio, pérdida de apetito, secreción nasal, dolor articular Raros: Reacción alérgica (hipersensibilidad), acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre)	Se puede tomar con o sin alimentos
Emtricitabina/tenofovir alafenamida	Descovy		Comprimido que contiene 200mg de emtricitabina y 10mg o 25mg* de tenofovir alafenamida	Un comprimido al día. La versión de 10mg está recomendada en combinación con algunos inhibidores de la proteasa potenciados	1	Habituales: Dolor de cabeza, mareo, sueños anómalos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, flatulencia, indigestión, erupción cutánea, cansancio Raros: Hinchazón de la piel, cara, labios, lengua o garganta	Se puede tomar con o sin alimentos
Emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Comprimido que contiene 200mg de emtricitabina y 245mg de tenofovir disoproxil fumarato	Un comprimido al día	1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, insomnio, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, reacción alérgica, erupción cutánea, picor, debilidad, dolor abdominal, fatiga, abotargamiento, flatulencia, ardor de estómago, niveles elevados en sangre de azúcar, enzima pancreática y triglicéridos, niveles elevados de enzima hepática o creatina quinasa, niveles bajos de fosfato en la sangre, oscurecimiento de la piel, recuento bajo de glóbulos blancos Raros: Fallo renal, acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre), adelgazamiento óseo, pancreatitis	Es preferible tomarlo con alimentos, pero puede tomarse con el estómago vacío
Lamivudina/zidovudina Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Comprimido que contiene 150mg de lamivudina y 300mg de zidovudina	Un comprimido dos veces al día	2	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, dolor de cabeza, mareo, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito, fiebre, dolor abdominal, pérdida de cabello, insomnio, erupción cutánea, tos, secreción nasal, dolor muscular o articular, pérdida de grasa, anemia, recuento bajo de glóbulos blancos, elevación de las enzimas hepáticas Raros: Daño hepático, anemia grave, acidosis láctica (exceso de ácido láctico en sangre)	Se puede tomar con o sin alimentos
Inhibidores de la integrasa							
Dolutegravir	Tivicay		Comprimido de 50mg	50mg una vez al día o 50mg dos veces al día, si se toma con efavirenz, nevirapina o tipranavir, o en el caso de que se sepa que el VIH es resistente a los inhibidores de la integrasa	1 o 2	Habituales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, erupción cutánea, picor, vómitos, dolor o molestia abdominal, dificultad para dormir, mareo, sueños anómalos, fatiga, flatulencia, aumento de las enzimas hepáticas, aumento de la creatina fosfoquinasa (enzimas producidas en los músculos) Raros: Reacción alérgica –hipersensibilidad- (erupción cutánea, fiebre, dolor muscular, formación de ampollas), inflamación hepática	Se puede tomar con o sin alimentos
Raltegravir	Isentress		Comprimidos de 400* y 600mg	400mg dos veces al día o dos comprimidos de 600mg una vez al día	2	Habituales: Pérdida de apetito, dolor de cabeza, dificultad para dormir, sueños anómalos, depresión, mareo, vértigo, agitación, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, diarrea, náuseas, vómitos, indigestión, erupción cutánea, debilidad, fatiga, fiebre, aumento de las enzimas hepáticas o pancreáticas, aumento de los triglicéridos Raros: Reacción alérgica –hipersensibilidad- (erupción cutánea, fiebre, dolor muscular, formación de ampollas), pensamientos y conductas suicidas, fallo hepático, fallo renal	Se puede tomar con o sin alimentos
Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN)							
Doravirina	Pifeltro		100mg de doravirina	100mg una vez al día	1	Habituales: Sueños anómalos, dificultad para dormir, pesadillas, depresión, dolor de cabeza, mareo, letargo, náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómitos, erupción cutánea, cansancio Raros: Pensamientos suicidas, daño renal agudo	Se puede tomar con o sin alimentos
Efavirenz Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Comprimido de 600mg y cápsula de 200mg	600mg una vez al día	1 o 3	Habituales: Erupción cutánea, picor, mareo, dolor de cabeza, sueños anómalos, ansiedad, depresión, dificultad para dormir, problemas de concentración, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cansancio, niveles elevados de triglicéridos y enzimas hepáticas Raros: Erupción cutánea grave, psicosis, tendencias suicidas, fallo hepático	Tomar con el estómago vacío, preferentemente al acostarse
Etravirina	Intencele		Comprimidos de 100 y 200mg*	200mg dos veces al día	2 o 4	Habituales: Anemia, recuento bajo de plaquetas, diabetes; niveles elevados en sangre de azúcar, triglicéridos o colesterol; ansiedad, dificultad para dormir, dolor de cabeza, infarto de miocardio, hipertensión arterial, indigestión y reflujo ácido, diarrea, náuseas, vómitos, flatulencia, dolor abdominal, fallo renal, cansancio, erupción cutánea, neuropatía periférica (daño en los nervios de manos o pies) Raros: Erupción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson)	Tomar con alimentos
Nevirapina Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Comprimidos de 200mg y 400mg (liberación prolongada)	200mg una vez al día durante dos semanas y después 200mg dos veces al día o 200mg una vez al día durante dos semanas y, posteriormente, 400mg una vez al día	2 o 1	Habituales: Reacción alérgica (hipersensibilidad), dolor de cabeza, erupción cutánea (por lo general, en las primeras seis semanas de tratamiento), fatiga, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, elevación de las enzimas hepáticas, hipertensión arterial Raros: Erupción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson)	Se puede tomar con o sin alimentos. Tragar el comprimido de 400mg entero
Rilpivirina	Edurant		Comprimido de 25mg	25mg una vez al día	1	Habituales: Insomnio, dolor de cabeza, náuseas, erupción cutánea, depresión, mareo, dolor abdominal, vómitos, reducción del recuento de glóbulos blancos o rojos, recuento bajo de plaquetas, niveles elevados de colesterol o triglicéridos o enzimas hepáticas o amilasa o lipasa pancreáticas, disminución del apetito, dificultad para dormir, sueños anómalos, ánimo decaído, cansancio, letargo, sequedad de boca Raros: Erupción cutánea grave y reacción alérgica (hipersensibilidad)	Tomar junto con una comida principal
Inhibidores de la proteasa							
Atazanavir Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Cápsulas de 150, 200 y 300mg	300mg con 100mg de ritonavir una vez al día	2 o 3 §	Habituales: Náuseas, diarrea, erupción cutánea, dolor abdominal, dolor de cabeza, vómitos, ardor de estómago, cansancio, aumento de los niveles de bilirrubina (pudiendo llevar a ictericia) Raros: Piedras renales, erupción cutánea grave y fiebre, alteraciones del ritmo cardiaco	Tomar con alimentos
Atazanavir/cobicistat	Evotaz		Comprimido que contiene 300mg de atazanavir y 150mg de cobicistat	Un comprimido al día	1	Habituales: Aumento del apetito, dificultad para dormir, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, alteración del gusto, aumento de los niveles de bilirrubina (pudiendo llevar a ictericia), náuseas, vómitos, diarrea, indigestión, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, sequedad de boca, erupción cutánea, cansancio Raros: Piedras renales, erupción cutánea grave y fiebre, alteraciones del ritmo cardiaco	Tomar con alimentos
Darunavir Medicamento genérico, su aspecto puede variar	generic		Comprimidos de 600 y 800mg	800mg con 100mg de ritonavir una vez al día o 600mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	2 a 4 §	Habituales: Diarrea, vómitos, náuseas, indigestión, erupción cutánea, picor, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, dolor de cabeza, fiebre, neuropatía periférica (daño en los nervios de manos o pies), lipodistrofia, dificultad para dormir, debilidad, cansancio, diabetes, niveles elevados de creatina o amilasa o triglicéridos o colesterol o enzimas hepáticas Raros: Función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco	Tomar con alimentos
Darunavir/cobicistat	Rezolsta		Comprimido que contiene 800mg de darunavir y 150mg de cobicistat	Un comprimido al día	1	Habituales: Diarrea, vómitos, náuseas, indigestión, erupción cutánea, picor, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, dolor de cabeza, pérdida de apetito, sueños anómalos, cansancio, diabetes, aumento de los niveles de creatina o amilasa o triglicéridos o colesterol o enzimas hepáticas Raros: Función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco	Tomar con alimentos
Lopinavir/ritonavir	Kaletra		Comprimido que contiene 200mg de lopinavir y 50mg de ritonavir	Dos comprimidos dos veces al día o cuatro comprimidos una vez al día	4	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, abotargamiento, flatulencia, cansancio, debilidad, dolor de cabeza, ardor de estómago e indigestión, pancreatitis, aumento de lípidos o azúcar en sangre, diabetes, hipertensión arterial, elevación de las enzimas hepáticas, tos, irritación de garganta, secreción nasal, infecciones sinusales, infecciones de la piel, erupción cutánea, picor, hinchazón alérgica, daño en los nervios periféricos, dificultad para dormir, mareo, dolor muscular, disfunción eréctil, trastornos menstruales Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco, función renal reducida	Tragar entero. Se puede tomar con o sin alimentos
Inhibidores del CCR5							
Maraviroc	Celsentri		Comprimidos de 150* y 300mg	300mg dos veces al día o 150mg dos veces al día con un inhibidor de la proteasa potenciado por ritonavir (excepto tipranavir y fosamprenavir) o 600mg dos veces al día con efavirenz o etravirina sin un inhibidor de la proteasa potenciado por ritonavir	2 a 4	Habituales: Hipotensión postural (mareo al levantarse muy rápido), anemia, náuseas, diarrea, dolor abdominal, abotargamiento, pérdida de apetito, flatulencia, debilidad, depresión, dificultad para dormir, niveles elevados de enzimas hepáticas, erupción cutánea Raros: Problemas hepáticos, reacción alérgica (hipersensibilidad) incluyendo picor, erupción cutánea, amarilleo de los ojos, vómitos, orina de color oscuro y dolor abdominal en el lado derecho	Se puede tomar con o sin alimentos
Potenciadores de otros fármacos							
Cobicistat	Tyboost		Comprimido de 150mg	Un comprimido al día	1	Habituales: Nivel elevado de azúcar en sangre, aumento del apetito, dificultad para dormir, letargo, sueños anómalos, dolor de cabeza, mareo, alteración del gusto, náuseas, diarrea, dolor abdominal, abotargamiento, latulencia, sequedad de boca, ictericia, erupción cutánea y cansancio Raros: Cálculos renales	Tomar con alimentos
Ritonavir	Norvir		Comprimido de 100mg	Para 'potenciar' a otros inhibidores de la proteasa 100-200mg una o dos veces al día	1 a 4	Habituales (a dosis reducida): Niveles elevados de lípidos, diarrea Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco, reacción alérgica grave (hipersensibilidad) y erupción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson)	Tragar entero. Tomar con alimentos para evitar náuseas