


Neželjeni efekti



This leaflet is available in large format as a PDF.
Call NAM on 020 7837 6988.

Third edition 2017
Due for review in 2020
Copyright ©NAM
If you need extra copies of this leaflet, or would like to translate, adapt or reproduce it, please contact us.

Beleške

Neki ljudi mogu imati alergijske reakcije na antiHIV lekove u roku od nekoliko dana od uzimanja, naročito ako lek koji uzimaju sadrži abacavir.

Najčešće neželjeno dejstvo je osip.

Želite li da saznate više?

Za više informacija o HIV-u, možete da posetite website www.aidsmap.com


Možete da nas kontaktirate kako biste dobili informacije o istraživanjima kojima je dokazano ovo što čitate na ovom prospektu.

Preporučujemo da razgovarate sa Vašim lekarom o informacijama na ovom prospektu.

Pored toga što održava kontrolu nad Vašom HIV infekcijom, antiretrovirusna terapija može imati i neželjena dejstva.

Kratkoročni neželjeni efekti

Neželjene reakcije na lek su najčešće posledica toga što Vaš organizam reaguje na novi lek




Često se ova neželjena dejstva mogu ukloniti uzimanjem drugih lekova. Ukoliko se nijedno od ovih neželjenih dejstava ne povuče, možete razgovarati sa svojim doktorom o promeni terapije.


Dugoročni neželjeni efekti

Ovakvi neželjeni efekti su mnogo ređi.


Važno je da redovno kontrolišete funkciju jetre, bubrega i kostiju



Kontrolišite nivo šećera u krvi i masti u organizmu. Povišeni nivoi mogu da znače da imate veći rizik za srčane bolesti.



Preterano dobijanje na telesnoj težini je danas retko neželjeno dejstvo, obzirom na to da se lekari trude da prepisuju lekove koji do toga ne dovode.



VAŽNO

I Najčešći neželjeni efekti su kratkoročni, i mogu se neutralisati lekovima.

II Dugoročni neželjeni efekti su mnogo ređi.

III Ukoliko imate neželjena dejstva, važno je da to kažete svom lekaru.