

Общее (непатентованное) наименование	Торговое наименование	Форма выпуска	Стандартная взрослая дозировка	Таблет/день	Основные проявления побочного действия	Диетические ограничения	
Схемы ВААРТ в одной таблетке							
Долутегравир / абакавир / ламивудин	<i>Триумеқ</i>		Таблетки, содержащие долутегравир 50 мг, абакавир 600 мг, ламивудин 300	Одна таблетка один раз в день	1	См. долутегравир, абакавир и лимивудин	Принимать с едой или натощак
Эфавиренз / эмтрицитабин / тенофовир	<i>Атрипла</i>		Таблетки, содержащие эфавиренз 600 мг, эмтрицитабин 200 мг и тенофовир 245 мг	Одна таблетка один раз в день	1	См. эфавиренз, эмтрицитабин, тенофовир	Принимать натощак желательно перед сном
Элвитегравир / кобицистат / эмтрицитабин / тенофовир	<i>Стриблд</i>		Таблетки, содержащие элвитегравир 150 мг, кобицистат 150 мг, эмтрицитабин 200 мг и тенофовир 245 мг	Одна таблетка один раз в день	1	Частовстречающиеся: тошнота, диарея, необычные сновидения, головная боль, усталость, головокружение, бессонница, кожная сыпь, метеоризм, сонливость Редковстречающиеся: тяжёлое нарушение функции печени или почек, снижение плотности костной ткани	Принимать во время еды
Рилпивирин / эмтрицитабин / тенофовир	<i>Эвиглера</i>		Таблетки, содержащие рилпивирин 25 мг,	Одна таблетка один раз в день	1	См. рилпивирин, эмтрицитабин, тенофовир	Принимать во время еды
Комбинированные препараты							
Абакавир / ламивудин	<i>Кивекса</i>		Таблетки, содержащие абакавир 600 мг и ламивудин 300 мг	Одна таблетка один раз в день	1	См. абакавир, ламивудин	Принимать во время еды или натощак
Абакавир / ламивудин / зидовудин	<i>Тризивир</i>		Таблетки, содержащие абакавир 300 мг, ламивудин 150 мг и зидовудин 300 мг	Одна таблетка два раза в день	2	См. абакавир, ламивудин и зидовудин	Принимать во время еды или натощак
Эмтрицитабин / тенофовир	<i>Трувада</i>		Таблетки, содержащие эмтрицитабин 200 мг и тенофовир 245 мг	Одна таблетка один раз в день	1	См. эмтрицитабин, тенофовир	Рекомендуется принимать во время еды, хотя может приниматься и натощак
Ламивудин / зидовудин	<i>Комбивир</i>		Таблетки, содержащие ламивудин 150 мг и зидовудин 300 мг	Одна таблетка два раза в день	2	См. ламивудин и зидовудин	Принимать во время еды или натощак
Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ)							
Абакавир	<i>Зиаген</i>		Таблетки по 300 мг	300 мг два раза в день или 600 мг один раз в день	2	Частовстречающиеся: тошнота, рвота, диарея, повышенная температура, головная боль, боль в животе, усталость, потеря аппетита Редковстречающиеся: реакция гиперчувствительности, лактоацидоз	Принимать во время еды или натощак
Эмтрицитабин	<i>Эмтрива</i>		Капсулы по 200 мг	200 мг один раз в день	1	Частовстречающиеся: тошнота, диарея, головная боль, повышение уровня креатинкиназы, потемнение (гиперпигментация) кожи Редковстречающиеся: лактоацидоз, нарушение функции печени	Принимать во время еды или натощак
Ламивудин	<i>Эпивир</i>		Таблетки по 150* и 300 мг	150 мг два раза в день или 300 мг один раз в день	2 1	Частовстречающиеся: тошнота, рвота, диарея, головная боль, боль в животе, алопеция, лихорадка, бессонница (нарушение сна), сыпь, усталость, боль в суставах Редковстречающиеся: лактоацидоз, нарушение функции печени	Принимать во время еды или натощак
Зидовудин	<i>Ретровир</i>		Капсулы по 100 и 250 мг*	250 мг два раза в день	2	Частовстречающиеся: тошнота, рвота, утомляемость, головная боль, головокружение, слабость, боли в мышцах, потеря аппетита, лихорадочное состояние Редковстречающиеся: нарушение кроветворения, липоатрофия, лактоацидоз	Принимать во время еды или натощак
Нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ)							
Тенофовир	<i>Виреад</i>		Таблетки по 245 мг	245 мг один раз в день	1	Частовстречающиеся: тошнота, рвота, диарея, повышенное газовыделение, головокружение, снижение уровня фосфата крови, слабость, сыпь, головная боль, боль в животе, усталость, метеоризм (вздутие живота) Редковстречающиеся: нарушение функции почек, снижение плотности костной ткани	Принимать во время еды
Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ)							
Эфавиренз	<i>Сустива Стокрин</i>		Таблетки по 600 мг* и капсулы по 200мг	600 мг один раз в день	1 или 3	Частовстречающиеся: сыпь, головокружение, нарушение сна, необычные сновидения, нарушение концентрации внимания, тошнота, рвота, головная боль, усталость, диарея, беспокойство, депрессия, суицидальные мысли Редковстречающиеся: психоз, сильновыраженная кожная сыпь, нарушение функции печени	Принимать натощак желательно перед сном
Этравирин	<i>Интеленс</i>		Таблетки по 100 и 200 мг *	200мг два раза в день	2 или 4	Частовстречающиеся: сыпь, периферическая нейропатия Редковстречающиеся: кожные проявления тяжёлой степени (синдром Стивенса-Джонсон)	Принимать во время еды
Невирапин	<i>Вирамун</i>		Таблетки по 200 мг	200 мг один раз в день в течение двух недель, затем 200 мг два раза в день	2	Частовстречающиеся: нарушение функции печени, аллергические реакции, сыпь, тошнота, головная боль, усталость, боль в животе, диарея Редковстречающиеся: кожные проявления тяжёлой степени (синдром Стивенса-Джонсона)	Принимать во время еды или натощак
Невирапин	<i>Вирамун пролонгированного действия</i>		Таблетки по 400 мг	400 мг один раз в день после первоначального приёма невирапина немедленного действия	1	Частовстречающиеся: нарушение функции печени, аллергические реакции, сыпь, тошнота, головная боль, усталость, боль в животе, диарея Редковстречающиеся: кожные проявления тяжёлой степени (синдром Стивенса-Джонсона)	Swallow whole. Take with or without food
Рилпивирин	<i>Эдурант</i>		Таблетки по 25 мг	25 мг один раз в день	1	Частовстречающиеся: бессонница, головная боль, сыпь, повышение уровня ферментов печени, депрессия, головокружение, боль в животе, рвота Редковстречающиеся: при дозировке, превышающей 25 мг, может вызывать нарушение сердечного ритма	Принимать во время еды
Ингибиторы протеазы							
Атазанавир	<i>Реатаз</i>		Капсулы по 150, 200 и 300 мг *	300 мг со 100 мг ритонавира один раз в день	2 или 3**	Частовстречающиеся: тошнота, диарея, кожная сыпь, боль в животе, головная боль, бессонница, рвота, гипербилирубинемия, липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет Редковстречающиеся: почечнокаменная болезнь, нарушение функции печени, изменения сердечного ритма	Принимать во время еды
Дарунавир	<i>Презиста</i>		Таблетки по 600* и 800 мг	800 мг со 100 мг ритонавира один раз в день или 600 мг со 100 мг ритонавира два раза в день	от 2 до 4**	Частовстречающиеся: диарея, тошнота, сыпь, боль в животе, рвота, головная боль, липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет, лихорадочное состояние Редковстречающиеся: нарушения функции печени, изменения сердечного ритма	Принимать во время еды
Фосампренавир	<i>Телзир</i>		Таблетки по 700 мг	700 мг со 100 мг ритонавира два раза в день	4 §	Частовстречающиеся: повышение липидов крови, тошнота, диарея, сыпь, боль в животе, головная боль, головокружение, усталость, покалывание губ, изменения функции печени и поджелудочной железы, липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет Редковстречающиеся: сильновыраженная сыпь, нарушения сердечного ритма	Принимать во время еды или натощак
Лопинавир / ритонавир	<i>Калетра</i>		Таблетки, содержащие лопинавир 200 мг и ритонавир 50 мг	Две таблетки два раза в день или четыре таблетки один раз в день	4	Частовстречающиеся: липодистрофия, повышение уровня печёночных ферментов, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, изжога, головная боль, повышение липидов крови, нарушение функции печени, сахарный диабет Редковстречающиеся: нарушения сердечного ритма	Принимать не разжёвывая во время еды или натощак
Ритонавир	<i>Норвир</i>		Таблетки по 100 мг	Полная дозировка: 600 мг два раза в день Для "усиления" действия других препаратов: 100 или 200 мг один или два раза в день	12 от 1 до 4	Частовстречающиеся (при полной дозировке): повышение уровня липидов и печёночных ферментов, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головная боль, слабость, онемение губ, неприятный привкус, липодистрофия, нарушение функции печени, сахарный диабет Частовстречающиеся (при низкой дозировке): повышение уровня липидов Редковстречающиеся: Нарушения сердечного ритма	Принимать не разжёвывая и во время еды во избежание тошноты
Типранавир	<i>Аптивус</i>		Капсулы по 250 мг	500 мг с 200 мг ритонавира два раза в день	8**	Частовстречающиеся: тошнота, диарея, рвота, боли в животе, усталость, головная боль, лихорадочное состояние, нарушения функции печени, сыпь, липодистрофия, лекарственный гепатит, сахарный диабет, повышение уровня липидов, повышенное газовыделение Редковстречающиеся: кровоизлияние в головной мозг, нарушения сердечного ритма	Принимать во время еды
Ингибитор CCR5							
Маравирик	<i>Селзенри</i>		Таблетки по 150 * и 300 мг	300 мг два раза в день или 150 мг два раза в день в сочетании с усиленным ритонавиром ингибитором протеазы (ИП) за исключением типранавира и фосампренавира или 600 мг два раза в день в сочетании с эфавирензом или этравиром без усиленного ритонавиром ингибитора протеазы (ИП).	от 2 до 4	Частовстречающиеся: тошнота, диарея, усталость, головная боль Редковстречающиеся: аллергические реакции, нарушение функции печени	Принимать во время еды или натощак
Ингибиторы интегразы							
Долутегравир	<i>Тивикей</i>		Таблетки по 50 мг	50 мг один раз в день или 50 мг два раза в день при совместном приеме с эфавирензом, невирапином или типранавиром или в случаях установленной устойчивости ВИЧ к ингибиторам интегразы	1 или 2	Частовстречающиеся: тошнота, диарея, головная боль, сыпь и кожный зуд, рвота, боль или дискомфорт в животе, бессонница, головокружение, необычные сновидения, утомляемость, повышенное газовыделение, повышение уровня печёночных и мышечных ферментов Редковстречающиеся: аллергические реакции, нарушение функции печени	Принимать во время еды или натощак
Элвитегравир	<i>Витекта</i>		Таблетки по 85 и 150 мг*	85 мг один раз в день совместно с атазанавиром/ритонавиром или лопинавиром/ритонавиром или 150 мг один раз в день с дарунавиром/ритонавиром или фосампренавиром/ритонавиром	1	Частовстречающиеся: боль в животе, рвота, сыпь, головная боль, диарея, тошнота, усталость Редковстречающиеся: депрессия, суицидальные мысли, бессонница, нарушение пищеварения (диспепсия), чувство вздутия живота, повышенное газовыделение, головокружение, парестезия (покалывание), сонливость, нарушение вкуса	Принимать во время еды
Ралтегравир	<i>Исентресс</i>		Таблетки по 400 мг	400 мг два раза в день	2	Частовстречающиеся: головная боль, бессонница Редковстречающиеся: сильновыраженная кожная сыпь, реакция гиперчувствительности, сильновыраженная жажда	Принимать во время еды или натощак

* Число таблеток для помеченной формы препарата

** Включая таблетки ритонавира

В качестве некоторых препаратов используются генерики, внешний вид которых может отличаться. Авторы этого издания приложили все необходимые предосторожности при разработке этой публикации. Ни NAM, ни авторы не несут ответственность за какие-либо неточности или неверную интерпретацию изложенных фактов. Используемая здесь информация в отношении любого варианта терапии не может быть использована в качестве гарантии со стороны NAM или авторов данной публикации. Предлагаемая здесь информация должна всегда использоваться наряду с профессиональной консультацией медицинского специалиста.

Перечень лекарственных препаратов разработан организацией NAM. NAM обеспечивает независимую и новейшую информацию для лиц, работающих в глобальной сфере борьбы с ВИЧ/

СПИД. Пожалуйста, посетите наш сайт, на котором вы сможете найти последние новости по лечению и профилактике ВИЧ и подписаться на бесплатные рассылки новостей по электронной почте.

Мы с нетерпением ждём ваших отзывов о наших информационных источниках.

Адрес **NAM, Acorn House, 314-320 Gray's Inn Road, Лондон, WC1X 8DP**
E-mail **info@nam.org.uk** Вебсайт **www.aidsmap.com**

Мы выражаем свою благодарность фармацевтической компании Viiv Healthcare за финансовую поддержку этого издания. Viiv Healthcare не осуществляет редакторский контроль за содержанием этой публикации.